

Gebrauchsinformation

Vetokehl Muc D5

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere (z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)

Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:

Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Vetokehl Muc D5** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Zieltierarten:

Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere (z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

bei Pferden und Rindern:	2 x wöchentlich	1 - 2 ml
bei Fohlen, Kälbern, Schweinen, Ziegen, Schafen:	2 x wöchentlich	1 ml
bei Hunden, Katzen, Ferkeln:	1 x wöchentlich	1 ml
bei Ziervögeln, Geflügel und kleinen Nagetieren:	1 x wöchentlich	0,5 ml

subkutan injizieren.

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:

Zur Verträglichkeit von **Vetokehl Muc D5** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Ziege, Schaf, Geflügel

Essbares Gewebe:

0 Tage

Eier:

0 Tage

Milch:

0 Tage

Besondere Lagerhinweise:

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25°C!

Das Verfalldatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt.

Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 1 ml enthält:

Wirkstoff:

1 ml Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos. (HAB, Vorschriften 5b, 11)

Darreichungsform und Inhalt:

10 / 50 Ampullen zu 1 ml flüssige Verdünnung zur s.c. Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Hasseler Steinweg 9

27318 Hoya

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 18287.00.01

Stand der Gebrauchsinformation:

Hinweis:

Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **Vetokehl Muc D5** Flüssige Verdünnung und Tabletten zur Verfügung.