

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

FINADYNE 50 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

fluniksin 50 mg
(v obliki megluminijevega fluniksinata)

Pomožna snov:

fenol (konzervans) 5,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml, 100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Govedo:

meso 4 dni

mleko 24 ur

Prašiči: 18 dni

Konji: 1 dan

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto vialo uporabite v 4 tednih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25°C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0134/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FINADYNE 50 mg/ml raztopina za injiciranje

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:
fluniksin 50 mg
(v obliki megluminijevega fluniksinata)

3. VSEBINA IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m., i.v.

5. KARENCA

Govedo:
meso 4 dni
mleko 24 ur
Prašiči: 18 dni
Konji: 1 dan

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številk}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Načeto vialo uporabite v 4 tednih.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Viala 100 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

FINADYNE 50 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

fluniksin 50 mg
(v obliki megluminijevega fluniksina)

Pomožna snov:

fenol (konzervans) 5,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Govedo:

meso 4 dni

mleko 24 ur

Prašiči: 18 dni

Konji: 1 dan

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto vialo uporabite v 4 tednih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25°C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0134/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}