

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος

Cartaxx 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες

2. Σύνθεση

Κάθε ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά

Καρπροφένη 50 mg

Έκδοχα:

Benzyl alcohol (E1519) 10 mg

Διαυγές ενέσιμο διάλυμα κίτρινου χρώματος.

3. Είδη ζώων

Σκύλος και γάτα

4. Θεραπευτικές ενδείξεις

Σκύλος: για τον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου και της φλεγμονής μετά από ορθοπεδικές επεμβάσεις και επεμβάσεις των μαλακών ιστών (συμπεριλαμβανομένων και των ενδοοφθαλμικών επεμβάσεων).

Γάτα: για τον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου μετά από επεμβάσεις.

5. Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, ή σε ζώα με γαστρεντερικά προβλήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα γαστρεντερικών ελκών ή αιμορραγίας.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε οποιοδήποτε άλλο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ), ή σε κάποιο έκδοχο αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

Να μη χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση.

Να μην χρησιμοποιείται μετά από επεμβάσεις που συνοδεύτηκαν από σημαντική απώλεια αίματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις.

Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας κάτω των 5 μηνών.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 10 εβδομάδων.

Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, βλ. επίσης παράγραφο «Ειδικές προειδοποιήσεις».

6. Ειδικές προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση στα είδη ζώων:

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση ή διάρκεια θεραπείας.

Η χρήση σε ηλικιωμένους σκύλους και ηλικιωμένες γάτες, ενδέχεται να εγκυμονεί επιπλέον κίνδυνο. Εάν η χρήση σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να αποφευχθεί, ενδέχεται να απαιτηθεί μειωμένη δοσολογία και προσεκτική κλινική διαχείριση αυτών των ζώων. Αποφεύγετε τη χρήση σε ζώα που πάσχουν από αφυδάτωση, υπογκαιμία ή υπόταση, επειδή υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυξημένης νεφροτοξικότητας.

Τα ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της φαγοκυττάρωσης και για τον λόγο αυτό σε περιπτώσεις θεραπείας φλεγμονωδών καταστάσεων που συνοδεύονται από βακτηριακή λοίμωξη θα πρέπει να χορηγούνται υπό ταυτόχρονη κατάλληλη αντιβιοτική κάλυψη.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Σε εργαστηριακές μελέτες, έχει φανεί ότι η καρπροφένη, όπως και άλλα ΜΣΑΦ, μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία. Η βενζυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει (αλλεργικές) αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Άτομα με γνωστή (υπερ)ευαισθησία στη βενζυλική αλκοόλη, στην καρπροφένη ή στα ΜΣΑΦ πρέπει να χορηγούν το προϊόν με προσοχή. Να αποφεύγεται η επαφή με δέρμα. Ξεπλύνετε αμέσως τυχόν σταγονίδια του φαρμάκου με καθαρό τρεχούμενο νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμένει. Απαιτείται προσοχή για την αποφυγή αυτοένεσης. Σε περίπτωση αυτοένεσης λόγω ατυχήματος, να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Εγκυμοσύνη:

Από τις εργαστηριακές μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) διαπιστώθηκαν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας από την καρπροφένη σε δόσεις παρόμοιες με τη θεραπευτική δόση.

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης. Να μην χορηγείται σε σκύλους ή γάτες κατά τη διάρκεια της κύησης.

Γαλουχία:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Να μην χορηγείται σε σκύλους ή γάτες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Η καρπροφένη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα, ή εντός 24 ωρών από τη χορήγηση άλλου ΜΣΑΦ ή σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή. Η καρπροφένη δεσμεύεται ισχυρά με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα φάρμακα που δεσμεύονται ισχυρά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικές επιδράσεις. Επομένως, πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με δυναμικά νεφροτοξικά φάρμακα.

Υπερδοσολογία:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο σε περίπτωση υπερδοσολογίας της καρπροφένης, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται η γενική υποστηρικτική αγωγή που εφαρμόζεται σε περίπτωση υπερδοσολογίας των ΜΣΑΦ.

Κύριες ασυμβατότητες:

Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

7. Ανεπιθύμητα συμβάντα

Σκύλοι και γάτες:

Σπάνια (1 έως 10 ζώα / 10.000 υπό θεραπεία ζώα):	Διαταραχή της πεπτικής οδού: απώλεια όρεξης, έμετος, γαστρεντερική εξέλκωση, υδαρή κόπρανα, (λανθάνουσα) αιμορραγία στα κόπρανα, διάρροια ^{1,2} Νεφρική διαταραχή. Ηπατική διαταραχή (ιδιοσυγκρασιακή). Αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης
Απροσδιόριστη συχνότητα (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)	Λήθαργος. ^{1,2} Αναιμία.

¹ Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παροδική και εξαφανίζεται μετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρή ή θανατηφόρα.

² Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, διακόψτε τη χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος και ζητήστε συμβουλή από κτηνίατρο.

³ Μετά από υποδόρια ένεση.

Η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας ενός προϊόντος. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε, καταρχάς, με τον κτηνίατρό σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα συμβάντα στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης, ή μέσω του εθνικού σας συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040213

e-mail: vetpharmacovigilance@eof.gr

Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης

Για ενδοφλέβια ή υποδόρια χρήση.

Σκύλος:

Η συνιστώμενη δόση είναι 4 mg καρπροφένης/kg σωματικού βάρους (ισοδυναμεί με 1 ml του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος/12,5 kg σωματικού βάρους).

Για την παράταση της αναλγητικής και αντιφλεγμονώδους θεραπείας μετά την επέμβαση, μπορεί να ακολουθηθεί παρεντερική θεραπεία μετά από 24 ώρες με δισκία καρπροφένης σε δόση 4 mg/kg/ημέρα έως και 5 ημέρες.

Γάτα:

Η συνιστώμενη δόση είναι 4 mg καρπροφένης/kg σωματικού βάρους (ισοδυναμεί με 0,08 ml του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος/1,0 kg σωματικού βάρους).

Εξαιτίας του μεγαλύτερου χρόνου ημίσειας ζωής στις γάτες και του περιορισμένου εύρους θεραπείας, ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δίνεται έτσι ώστε να μη γίνεται υπέρβαση ή επανάληψη της συνιστώμενης δόσης. Συνιστάται η χρήση μιας βαθμονομημένης σύριγγας του 1 ml, έτσι ώστε να υπολογίζεται η δόση με ακρίβεια.

Η παρεντερική θεραπεία μπορεί να μη ακολουθηθεί με δισκία καρπροφένης.

Τα πώματα εισχώρησης δεν θα πρέπει να ανοιχθούν περισσότερες από 30 φορές.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι προτιμότερο να χορηγείται πριν από την επέμβαση, είτε κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής αγωγής είτε κατά την εγκατάσταση της αναισθησίας.

10. Χρόνοι αναμονής

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή του.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά το Exp. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες.

12. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή <των οικιακών αποβλήτων>.

Χρησιμοποιήστε προγράμματα επιστροφής φαρμάκων για την απόρριψη μη χρησιμοποιηθέντων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και με τυχόν ισχύοντα εθνικά συστήματα συλλογής. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.

13. Ταξινόμηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Να χορηγείται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. Αριθμοί άδειας κυκλοφορίας και συσκευασίες

Ένα διαφανές γυάλινο (τύπου I) φιαλίδιο με γκρίζο ελαστικό πώμα εισχώρησης από βρωμοβουτύλιο και πώμα από αλουμίνιο μέσα σε χάρτινο κουτί.

Συσκευασίες:

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 10 ml.

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 20 ml.

Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 50 ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

15. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα κτηνιατρικά προϊόντα (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Στοιχεία επικοινωνίας

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Ολλανδία

Τοπικοί αντιπρόσωποι και στοιχεία επικοινωνίας για την αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Candilidis S.A.
Ilektras 4B & Kymis Avenue
15122 Marousi, Athens
Ελλάδα
info@candilagro.gr
Tel: +30 210 6910311