

ЛИСТОВКА:

DELTATIC лечебен нашийник за големи до много големи кучета

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на разрешението за търговия:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Gran Via Carles III, 98, 7^a

08028 Barcelona

Spain

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

AB7 SANTE

Chemin des Monges

31450 Deyme

France

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

DELTATIC лечебна нашийник за големи до много големи кучета

Deltamethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА

Един нашийник от 75 cm (32.60g) съдържа:

Активна субстанция:

Deltamethrin.....1.304 g

Ексципиент:

Titanium dioxide (E171).....0.489 g

Бял лечебен нашийник.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Нашийникът проявява:

- репелентен ефект (анти-хранене) за период от 5 месеца спрямо пясъчни мухи (*Phlebotomus perniciosus*)
- репелентен ефект за период от 6 месеца спрямо комари (*Culex pipiens*)

Нашийникът предпазва от:

- опаразитяване с кърлежи за период от 6 месеца.
- опаразитяване с бълхи за период от 4 месеца.

Доказана е репелентна ефикасност (анти-хранене) срещу *Phlebotomus* spp., така че употребата на този лечебен нашийник може да се приеме като част от програмата за превенция на лайшманиоза, както и репелентна ефикасност срещу комари от вида *Culex pipiens*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при кучета с кожни лезии.

Да не се използва при кученца на възраст под 7 седмици.

Да не се използва при котки.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В редки случаи се наблюдава:

- локални алергични реакции (сърбеж, еритема, алоpecia), включващи шията или кожата като цяло, които могат да показват локална или обща реакция на свръхчувствителност.
- стомашно-чревни симптоми, като повръщане, диария и хиперсаливация.
- невромускулни проблеми, като атаксия и мускулен тремор.

Освен това, в редки случаи е съобщено и за променено поведение (например летаргия и хиперактивност), понякога свързано с дразненето на кожата.

По принцип, симптомите изчезват в рамките на 48 часа след отстраняване на нашийника. Лечението трябва да бъде симптоматично, тъй като не е известен специфичен антидот.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и) реакция(и))
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП


Кучета (> 25 kg), за големи до много големи кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Един нашийник на животно. Нашийникът с дължина 75 cm е предназначен за употреба при големи до много големи кучета. Обхваща врат с обиколка 65 cm.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Извадете нашийника от опаковката и отделете удобно поставената лента за отлепване. Нагласете нашийника около врата на животното, без да го стягате прекалено. Между нашийника и врата на кучето трябва да се побират два прилепени един до друг пръста. Плъзнете края през катарамата и отрежете всяка излишна дължина, надвишаваща 5 cm.



Този нашийник е проектиран с механизъм за безопасно затваряне (безопасност срещу удушаване). Дори и при малко вероятен случай куче да се закачи някъде с нашийника си, собствената сила на кучетата е достатъчна, за да разшири нашийника, за да позволи бързото му освобождаване.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се пази сашето във външната опаковка (картонена/метална кутия) с цел предпазване от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху сашето и картонената/металната кутия след {Годен до}. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Тъй като нашийникът проявява пълния си ефект след една седмица, за предпочитане е той да се приложи една седмица преди животните да бъдат изложени на евентуално опаразитяване. Кърлежите ще бъдат умъртвени и ще паднат от гостоприемника в рамките на 24 до 48 часа след опаразитяването, без да са се хранили с кръв, но прикрепването на единични кърлежи след лечението не може да бъде изключено. По този начин не може напълно да се изключи предаването на инфекциозни заболявания чрез кърлежи. При неблагоприятни условия, предаването на инфекциозни заболявания чрез пясъчни мухи не може да се изключи напълно.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Ефектът от къпането с шампоан върху ефикасността на ветеринарномедицинския продукт не е тестван.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Случайното поглъщане на този ветеринарномедицински продукт може да причини неблагоприятни реакции, включително невротоксични такива. Съхранявайте сашето с нашийника в картонената кутия до готовност за неговата употреба.

Избягвайте да оставяте децата да докосват нашийника, да си играят с него или да го поставят в

устата си. Незабавно изхвърлете всички остатъци или отрязъци на нашийника. Измийте ръцете си със студена вода, след като поставите нашийника.

Избягвайте продължителния, интензивен контакт с нашийника или с животно, което го носи (напр. спане с животното). Това е особено валидно за деца.

Не пушете, не яжте и не пийте, докато боравите с нашийника. Пазете нашийника далеч от храни, напитки и храни за животни.

При случайно поглъщане или инцидентна орална експозиция, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Deltamethrin може да причини реакции на свръхчувствителност (алергии) при чувствителни хора. Хора с установена свръхчувствителност към deltamethrin трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. В случай на реакция на свръхчувствителност, незабавно да се потърси медицински съвет.

Други предпазни мерки:

Deltamethrin е токсичен за водните организми. Извадете нашийника, преди да оставите кучето да плува и преди да го къпете, за да избегнете неблагоприятно въздействие върху водните организми. Не трябва кучетата да бъдат допускани да плуват във вода през първите пет дни от носенето на нашийника.

Бременност и лактация:

Не са наблюдавани вторични ефекти при бременни кучета, използващи нашийника през периода на бременност и лактация, нито при кученца на майки, лекувани с нашийника до отбиването.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се използва с други ектопаразитициди (пиретроиди или органофосфати).

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При случайно поглъщане на нашийника от кучето, свържете се с вашия ветеринарен лекар. Могат да се наблюдават следните клинични признаци на интоксикация: некоординирани движения, тремор, хиперсаливация, повръщане, скованост на задните части. Тези клинични признаци обикновено отшумяват в рамките на 48 часа. В случай на поглъщане, стопанинът на животното трябва да се свърже с ветеринарния си лекар и не трябва да започва симптоматично лечение, като единствено ветеринарният лекар трябва да прецени необходимостта от всяко симптоматично лечение.

Основни несъвместимости:

Не е приложимо.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Deltamethrin е токсичен за пчелите, рибите и други водни организми. Този ветеринарномедицински продукт не трябва да попада във водни басейни. Не изхвърляйте нашийника в околната среда или вода след употреба.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

06/2024

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена или метална кутия с едно саше, съдържащо 1 нашийник от 75 cm.

Картонена или метална кутия с две сашета, всяко съдържащо 1 нашийник от 75 cm.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП