

ЛИСТОВКА:

КАЛЦИН, инжекционен разтвор - говеда, коне, овце, кози, свине и кучета.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на разрешението за търговия:

СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16
1220 София, България
E-mail: sopharma.bg

Производител:

СОФАРМА АД
Бул.Тракия № 75
Р. България, гр. Сливен 8800
тел.: +359 44 61 60 60
факс: +359 44 61 60 66

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

КАЛЦИН, инжекционен разтвор

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 100 ml от продукта се съдържат:

Calcium gluconate	16.00 g
Calcium glycerophosphate	6.60 g
Magnesium chloride hexahydrate	6.40 g
Caffeine	2.50 g

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Остеодистрофии, свързани с недостиг на калций и фосфор – рахит при младите и растящите животни, остеопороза и остеомаляция при възрастните животни; фиброзна остеоидистрофия, дължаща се на хипертироидизъм вследствие недостиг на калциеви йони в кръвта;
- Предродилна и следродилна пареза при кравите и овцете вследствие остра хипокалцемиа, често съпроводена и с хипомагнезиемиа;
- Млечна тетания при кобили и транспортна тетания при преживни животни, свързани с остра хипокалцемиа;
- Хипомагнезиемична (тревна) тетания при крави, телета и овце;
- Естрални и постестрални метрорагии и като кръвоспиращо средство при стомашно-чревни, белодробни и следродилни кръвотечения, петехиална треска и други хеморагични диатези;
- Следродилна хемоглобинурия при крави;
- Костни операции и фрактури;
- Алергични заболявания (астма, уртикария, лекарствени алергии, серумна болест и др.);
- Възпалителни процеси на дихателните пътища, пододерматити, менингити, предродилна и следродилна оток на вимето, ММА-синдром при свинете, плеврити, изтощителни диарии, общо изтощение и рековалесцентни състояния;
- Ендометри и метрити, за стимулиране на родовата дейност и за ускоряване отделянето на последъка;

- Потиснатост на нервната система и дишането при отравяне с наркотици, заразни и незаразни заболявания, фуражни отравяния и отравяния с олово, натриев хлорид, оксалова киселина, флуорни съединения;
- Едемна болест при прасета, еклампсия при кучета, атония на предстомашията, хипотония, снемане пристъпите на хипокалцемична тетания (гърчове) при прасета.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при хиперкалцемия, хиперкоагулация, брадикардия, атриовентрикуларна блокада и вентрикуларна фибриляция; едновременно с дигиталисови продукти; при тежки бъбречни и сърдечни заболявания; при миастения гравис.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Бързото интравенозно приложение може да предизвика брадикардия, хипотензия, аритмии, коронаростазъм, спиране на сърдечната дейност и нервно-мускулна блокада. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози, свине и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

За интрамускулно или много бавно интравенозно приложение:

Говеда: 100 - 200 ml бавно интравенозно;

Коня: 100 ml бавно интравенозно;

Овце, кози и свине: 20 - 30 ml бавно интравенозно или дълбоко интрамускулно;

Кучета: 5 - 10 ml бавно интравенозно или дълбоко интрамускулно.

При необходимост третирането може да бъде повторено след 2 до 3 часа, или по съвет на отговорния ветеринарен лекар. За профилактични цели, 2-3 третираня се извършват за период от 2-3 дни.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Уверете се, че съдържанието на опаковката е темперирано до телесната температура на животното, което ще бъде третирано.

Следете постоянно сърдечната функция по време на интравенозно приложение.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

В случай на остра хипомагнезиемия може да се наложи приложение на разтвор с по-висока концентрация на магнезий.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Преди интравенозна инфузия продукта трябва да се затопля до телесната температура на животното и да се въвежда много бавно интравенозно с помощта на тънка инжекционна игла. Да не се допуска екстравазално попадане на разтвора. Да не се инжектират интрамускулно повече от 20 - 30 ml в едно място при говеда и коне и повече от 5 – 10 ml при свине, овце, кози и кучета.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Трябва да се избягва случайното самоинжектиране.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Калциевите йони сенсibiliзират сърцето към дигиталисовите гликозиди и усилват действието им. Магнезиевите йони, директно потискат нервно-мускулното предаване чрез инхибиране отделянето на ацетилхолин и намаляване чувствителността на постсинаптичните мембрани. Това води до усилване и удължаване действието на други субстанции с миорелаксантно действие (тубокурарин, суксаметоний, декаметоний и др.) и други блокатори на нервно-мускулната проводимост (аминогликозиди, полимиксинови и линкозамидни антибиотици и антибиотика амфотерицин В). Не се препоръчва едновременно приложение на продукта с глюкокортикоиди, които намаляват серумното ниво на калция и усилват излъчването му с урината.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При предозиране и бързо интравенозно приложение се получава хиперкалцемия, характеризираща се с анорексия, повръщане, обстипация, мускулна слабост, полидипсия, полиурия, сърдечна аритмия и кома. За бързо преодоляване на хиперкалцемията се прилага интравенозно 0,9 % натриев хлорид (за възстановяване на кръвния волумен и усилване на диурезата), диуретици (фуросемид), интравенозно приложение на фосфати и ЕДТА-Na₂. При хипермагнезиемия се наблюдават потиснатост на ЦНС и дишането, мускулна слабост, хипотензия, брадикардия и в много тежки случаи – спиране на сърдечната дейност. Бавното интравенозно приложение на калциеви соли води до бързо преодоляване на симптомите на интоксикация.
Продуктът КАЛЦИН инжекционен разтвор съдържа калциеви, фосфорни и магнезиеви соли в количества, които след прилагане в препоръчаните дози в организма водят до възстановяване нивата на калциевите, фосфорните и магнезиевите йони в кръвта до физиологичните норми. При това споменатите йони взаимно допълват, а при дисбаланс и антагонизират неблагоприятните си ефекти, с което се обяснява много добрата обща поносимост на продукта.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/2025

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

11.12.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV