

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/05/1647

S.O.S. Flea & Tick Collar 4,205 g kakla siksna suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
The Netherlands
tālr.: 0031 (0)572 348 834
fakss: 0031 (0)572 348 835
e-pasts: hqb@beaphar.nl

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

S.O.S. Flea & Tick Collar
4,205 g kakla siksna suņiem
Tetrachlorvinphos

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena 29 g kakla siksna satur -

Aktīvā viela:
tetrahlorvinilfosfāts 4,205 g

Palīgvielas:
polivinilhlorīds, di-isononīla adipāts, kalcija karbonāts, sojas eļļa, titāna dioksīds, kalcija stearāts, cinka stearāts, stearīnskābe

4. INDIKĀCIJA(AS)

Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērcu invāzijas gadījumā.
Iedarbības laiks pret blusām – 8 mēneši, pret ērcēm – 4 mēneši

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot vājiem, slimiem un atveseļošanās periodā esošiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiem, dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret fosfora organiskiem savienojumiem, dzīvniekiem grūsnības periodā, kucēniem, kas ir jaunāki par 2 mēnešiem.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ādas alerģiska reakcija sastopama ļoti reti. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRKA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Attaisiet iepakojumu tieši pirms lietošanas. Atritīniet kakla siksnu un aktivizējiet izstiepjot to aiz abiem galiem. Aplieciet to brīvi ap dzīvnieka kaklu. Pārliecinieties vai starp siksnu un kaklu ir divu pirkstu platuma brīva atstarpe. Nogrieziet lieko kakla siksna daļu. Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm pēc lietošanas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dzīvnieku kakla siksna lietošanas ilgums ir 8 mēneši. Stipras invāzijas gadījumā jauna kakla siksna jāsāk lietot ātrāk. Kakla siksna iedarbība palielinās, ja pirms lietošanas tā tiek sildīta ar dzīvnieka ķermeni un labi izstiepta. Atkārtojiet kakla siksna izstiepšanu katras četras nedēļas. Aplieciet to brīvi ap dzīvnieka kaklu. Nogrieziet lieko kakla siksna daļu, ņemot vērā dzīvnieka augšanu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā, labi aiztaisītā iepakojumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barību. Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pārdozēšanas gadījumā antidots – atropīns. Toksisks pēc norīšanas. Dzīvnieki, kuri valkā kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem. Pēc saskarsmes ar ādu, skalot ar lielu ūdens daudzumu. Aizliegts lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

072012

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi