

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**SCHACHTEL MIT 50 ML, 100 ML UND 250 ML****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hymatil 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: Tilmicosin 300 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

6 x 50 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schafe.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

i

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Nur zur subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 70 Tage

Milch: 36 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Milch: 18 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern
Die Ampulle im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

"DIE INJEKTION VON TILMICOSIN BEIM MENSCHEN KANN TÖDLICH SEIN - LASSEN SIE ÄUSSERSTE VORSICHT WALTEN, UM EINE VERSEHENTLICHE SELBSTINJEKTION ZU VERMEIDEN UND BEFOLGEN SIE DIE VERABREICHUNGSANWEISUNGEN GENAU."
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V350296

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**FLASCHE 50 ML****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hymatil

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Tilmicosin 300 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHE 100 ML UND 250 ML****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hymatil 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: Tilmicosin 300 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schafe.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Nur zur subkutanen Anwendung.

"DIE INJEKTION VON TILMICOSIN BEIM MENSCHEN KANN TÖDLICH SEIN - LASSEN SIE ÄUSSERSTE VORSICHT WALTEN, UM EINE VERSEHENTLICHE SELBSTINJEKTION ZU VERMEIDEN, UND BEFOLGEN SIE DIE VERABREICHUNGSANWEISUNGEN GENAU."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 70 Tage

Milch: 36 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Milch: 18 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern

Die Ampulle im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}