

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Interflox-100 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

Učinkovine:

Enrofloksacin 100,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



Govedo, ovce, koze, prašiči.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Govedo: intravenska uporaba

Govedo, ovce, koze: subkutana uporaba

Prašiči: intramuskularna uporaba

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: *Po intravenskem dajanju:*

Meso in organi: 5 dni.

Mleko: 3 dni.

Po subkutanem dajanju:

Meso in organi: 12 dni.

Mleko: 4 dni.

Ovce: Meso in organi: 4 dni.

Mleko: 3 dni.

Koze: Meso in organi: 6 dni.
Mleko: 4 dni.

Prašiči: Meso in organi: 13 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po prvem odpiranju stične ovojnine ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0661/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklenica 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Interflox-100 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

Učinkovine:

Enrofloksacin 100,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce, koze, prašiči.

4. POTI UPORABE

Govedo: intravenska uporaba

Govedo, ovce, koze: subkutana uporaba

Prašiči: intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: *Po intravenskem dajanju:*

Meso in organi: 5 dni.

Mleko: 3 dni.

Po subkutanem dajanju:

Meso in organi: 12 dni.

Mleko: 4 dni.

Ovce: Meso in organi: 4 dni.

Mleko: 3 dni.

Koze: Meso in organi: 6 dni.

Mleko: 4 dni.

Prašiči: Meso in organi: 13 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po prvem odpiranju stične ovojnine ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}