

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**KARTONSCHACHTEL**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bimacure 500 mg Suspension zur intrauterinen Anwendung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder 19-g-Polyethylen-Injektor enthält eine ölige Suspension von 500 mg Cefapirin (als Cefapirin-Benzathin).

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Jede Packung enthält: 10 x 19-g-Injektoren, 10 Intrauterinkatheter und 10 Einmalhandschuhe.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh).

**5. ANWENDUNGSGEBIET**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intrauterine Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 2 Tage.

Milch: Null Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12 KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER  
AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited.

**14. ZULASSUNGSNUMMER**

841394

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**ETIKETT**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bimacure 500 mg Suspension zur intrauterinen Anwendung

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

19 g enthalten 500 mg Cefapirin (als Cefapirin-Benzathin).

Die Injektoren sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.