

## Gebrauchsinformation

ampicillin-t  
Kapseln  
**57,75 mg**

Kapseln für Brieftauben

Wirkstoff: Ampicillintrihydrat

MIT Gesundheit GmbH

## Gebrauchsinformation

ampicillin-t  
Kapseln  
**57,75 mg**

Kapseln für Brieftauben

Wirkstoff: Ampicillintrihydrat

MIT Gesundheit GmbH

## Gebrauchsinformation

ampicillin-t  
Kapseln  
**57,75 mg**

Kapseln für Brieftauben

Wirkstoff: Ampicillintrihydrat

MIT Gesundheit GmbH

## Gebrauchsinformation

**Name und Anschrift des Zulassungs-inhabers**

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,  
D-47533 Kleve

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

ampicillin-t **57,75 mg**  
Kapseln für Brieftauben

**Wirkstoff und sonstige Bestandteile**

1 Kapsel enthält:  
Wirkstoff:  
Ampicillintrihydrat 57,75 mg

**Anwendungsgebiete**

Für Brieftauben zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit grampositiven und grammnegativen Ampicillin-empfindlichen Bakterien. Wegen des Vorliegens sehr hoher Resistenzraten bei E. coli und Salmonellen sollte vor einer Behandlung von Infektionen des Verdauungsapparates mit Ampicillin die Erregersensitivität geprüft werden.

**Gegenanzeigen**

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

## Gebrauchsinformation

**Name und Anschrift des Zulassungs-inhabers**

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,  
D-47533 Kleve

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

ampicillin-t **57,75 mg**  
Kapseln für Brieftauben

**Wirkstoff und sonstige Bestandteile**

1 Kapsel enthält:  
Wirkstoff:  
Ampicillintrihydrat 57,75 mg

**Anwendungsgebiete**

Für Brieftauben zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit grampositiven und grammnegativen Ampicillin-empfindlichen Bakterien. Wegen des Vorliegens sehr hoher Resistenzraten bei E. coli und Salmonellen sollte vor einer Behandlung von Infektionen des Verdauungsapparates mit Ampicillin die Erregersensitivität geprüft werden.

**Gegenanzeigen**

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

## Gebrauchsinformation

**Name und Anschrift des Zulassungs-inhabers**

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,  
D-47533 Kleve

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

ampicillin-t **57,75 mg**  
Kapseln für Brieftauben

**Wirkstoff und sonstige Bestandteile**

1 Kapsel enthält:  
Wirkstoff:  
Ampicillintrihydrat 57,75 mg

**Anwendungsgebiete**

Für Brieftauben zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit grampositiven und grammnegativen Ampicillin-empfindlichen Bakterien. Wegen des Vorliegens sehr hoher Resistenzraten bei E. coli und Salmonellen sollte vor einer Behandlung von Infektionen des Verdauungsapparates mit Ampicillin die Erregersensitivität geprüft werden.

**Gegenanzeigen**

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie. Vorliegen von  $\beta$ -Lactamase-bildenden Erregern. Die Verabreichung während der ersten 12 - 14 Aufzuchttage wird nicht empfohlen. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Hasen, Kaninchen und Nagetieren (Meerschweinchen, Hamstern, Gerbilen etc.) anwenden.

**Nebenwirkungen**

Der Gebrauch von Penicillin, so auch von Ampicillin, kann allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Ana-phylaxie) auslösen. Falls Sie eine Ne-benwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Pack-ungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierart**

Brieftaube

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**  
Zum Eingeben.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie. Vorliegen von  $\beta$ -Lactamase-bildenden Erregern. Die Verabreichung während der ersten 12 - 14 Aufzuchttage wird nicht empfohlen. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Hasen, Kaninchen und Nagetieren (Meerschweinchen, Hamstern, Gerbilen etc.) anwenden.

**Nebenwirkungen**

Der Gebrauch von Penicillin, so auch von Ampicillin, kann allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Ana-phylaxie) auslösen. Falls Sie eine Ne-benwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Pack-ungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierart**

Brieftaube

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**  
Zum Eingeben.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie. Vorliegen von  $\beta$ -Lactamase-bildenden Erregern. Die Verabreichung während der ersten 12 - 14 Aufzuchttage wird nicht empfohlen. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Hasen, Kaninchen und Nagetieren (Meerschweinchen, Hamstern, Gerbilen etc.) anwenden.

**Nebenwirkungen**

Der Gebrauch von Penicillin, so auch von Ampicillin, kann allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Ana-phylaxie) auslösen. Falls Sie eine Ne-benwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Pack-ungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierart**

Brieftaube

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**  
Zum Eingeben.

Brieftauben: 115,5 mg Ampicillintrihydrat pro kg Körpermasse (KM) pro Tag entsprechend:  
57,75 mg Ampicillintrihydrat pro Tier (500 g KM)  
1 Kapsel pro Tier mit 500 g KM.

Dauer der Anwendung: 5 Tage.

Sollte nach maximal 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung einge-treten sein, so wird die Fortsetzung der Behandlung mit ampicillin-t Kapseln nur nach Sicherstellung der Erreger-sensitivität durch ein Antibiotogramm empfohlen, ggf. ist ein Wechsel des Wirkstoffs erforderlich.

#### Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

#### Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

#### Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Brieftauben: 115,5 mg Ampicillintrihydrat pro kg Körpermasse (KM) pro Tag entsprechend:  
57,75 mg Ampicillintrihydrat pro Tier (500 g KM)  
1 Kapsel pro Tier mit 500 g KM.

Dauer der Anwendung: 5 Tage.

Sollte nach maximal 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung einge-treten sein, so wird die Fortsetzung der Behandlung mit ampicillin-t Kapseln nur nach Sicherstellung der Erreger-sensitivität durch ein Antibiotogramm empfohlen, ggf. ist ein Wechsel des Wirkstoffs erforderlich.

#### Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

#### Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

#### Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Brieftauben: 115,5 mg Ampicillintrihydrat pro kg Körpermasse (KM) pro Tag entsprechend:  
57,75 mg Ampicillintrihydrat pro Tier (500 g KM)  
1 Kapsel pro Tier mit 500 g KM.

Dauer der Anwendung: 5 Tage.

Sollte nach maximal 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung einge-treten sein, so wird die Fortsetzung der Behandlung mit ampicillin-t Kapseln nur nach Sicherstellung der Erreger-sensitivität durch ein Antibiotogramm empfohlen, ggf. ist ein Wechsel des Wirkstoffs erforderlich.

#### Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

#### Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

#### Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.  
Nicht über 25°C lagern.

#### Besondere Warnhinweise

Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit schnell einsetzender bakteriostatischer Wirkung. Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

#### Überdosierung:

Nach Überdosierung können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungsscheinungen und Krämpfe auftreten. Das Präparat ist sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln. Bei Anaphylaxie: Epinephrin i.V.. Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistamika. Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten als Antidot.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.  
Nicht über 25°C lagern.

#### Besondere Warnhinweise

Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit schnell einsetzender bakteriostatischer Wirkung. Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

#### Überdosierung:

Nach Überdosierung können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungsscheinungen und Krämpfe auftreten. Das Präparat ist sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln. Bei Anaphylaxie: Epinephrin i.V.. Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistamika. Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten als Antidot.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.  
Nicht über 25°C lagern.

#### Besondere Warnhinweise

Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit schnell einsetzender bakteriostatischer Wirkung. Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

#### Überdosierung:

Nach Überdosierung können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungsscheinungen und Krämpfe auftreten. Das Präparat ist sofort abzusetzen und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln. Bei Anaphylaxie: Epinephrin i.V.. Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistamika. Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten als Antidot.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien**  
Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Zulassungsnummer**  
5611.00.01

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**  
Juni 2025

**Weitere Angaben**  
Packungsgröße: 100 Kapseln

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien**  
Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Zulassungsnummer**  
5611.00.01

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**  
Juni 2025

**Weitere Angaben**  
Packungsgröße: 100 Kapseln

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien**  
Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Zulassungsnummer**  
5611.00.01

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**  
Juni 2025

**Weitere Angaben**  
Packungsgröße: 100 Kapseln

**Beschriftung  
Behältnis; Äußere Umhüllung**

# ampicillin-t

**57,75 mg  
Kapseln für Brieftauben  
Wirkstoff: Ampicillintrihydrat**

**Anwendungsgebiete**

Für Brieftauben zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit grampositiven und gram-negativen Ampicillin-empfindlichen Bakterien.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Zusammensetzung**

1 Kapsel enthält:

Wirkstoff: Ampicillintrihydrat 57,75 mg

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Kapseln zum Eingeben.

Brieftauben: 1 Kapsel pro Tier mit 500 g KGW und Tag.

Dauer der Anwendung: 5 Tage.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Vorgeschriebene Dosierung:**

**Wartezeit**

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**Hinweis:**

Für Tiere

**Entsorgungshinweis:**

Siehe Packungsbeilage.

**Lagerungshinweis:**

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**Inhalt:**

Ch. -B.:

Verwendbar bis

**Verschreibungspflichtig**

**Zul.-Nr.: 5611.00.01**

MIT Gesundheit GmbH

Thaerstraße 4a

D-47533 Kleve