

ETIQUETADO

<DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 FRASCO DE 200 ml/ 1 litro/ 2,5 litros/ 5 litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VECOXAN 2,5 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL TERNEROS Y CORDEROS
Diclazurilo

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene: Diclazurilo 2,5 mg como sustancia activa y parahidroxibenzoato de metilo (E218) 1,8 mg y parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg como excipientes.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral, blanca.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Caja con 1 frasco de 200 ml con tapón adaptador y correa.
Caja con 1 frasco de 1 litro con tapón adaptador y correa.
Caja con 1 frasco de 2,5 litros con tapón adaptador y correa.
Caja con 1 frasco de 5 litros con tapón adaptador y correa.

5. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (corderos) y Bovino (terneros)

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

En corderos:

Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis*.

En terneros:

Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii*.

Si no hay un historial reciente y confirmado de coccidiosis clínica, antes de tratar debe confirmarse la presencia de coccidios en el rebaño o manada mediante muestreos fecales.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

1 mg de diclazurilo por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml de la suspensión oral por cada 2,5 kg de peso vivo) en administración oral única.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: Corderos: cero días
Terneros: cero días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD { Mes/Año }

Período de validez después de abierto el envase: 3 meses

Una vez abierto el envase primario utilizar antes de: __ / __ / __

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.
Polígono Industrial El Montalvo I
C/ Zeppelin, 6 – Parcela 38
37008 Carbajosa de La Sagrada
Salamanca, España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1309 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN
--

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

FRASCO DE 200 ml/ 1 litro/ 2,5 litros/ 5 litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VECOXAN 2,5 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL TERNEROS Y CORDEROS
Diclazurilo

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene: Diclazurilo 2,5 mg como sustancia activa y parahidroxibenzoato de metilo (E218) 1,8 mg y parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg como excipientes.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral, blanca.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Frasco de 200 ml con tapón adaptador y correa.
Frasco de 1 litro con tapón adaptador y correa.
Frasco de 2,5 litros con tapón adaptador y correa.
Frasco de 5 litros con tapón adaptador y correa.

5. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (corderos) y Bovino (terneros)

6. INDICACIÓN(ES) DE USOEn corderos:

Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidealis*.

En terneros:

Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii*.

Si no hay un historial reciente y confirmado de coccidiosis clínica, antes de tratar debe confirmarse la presencia de coccidios en el rebaño o manada mediante muestreos fecales.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

1 mg de diclazurilo para uso veterinario por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml de la suspensión oral por cada 2,5 kg de peso vivo) en administración oral única.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: Corderos: cero días
Terneros: cero días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD { Mes/Año }

Período de validez después de abierto el envase: 3 meses

Una vez abierto el envase primario utilizar antes de: __ / __ / __

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.
Polígono Industrial El Montalvo I
C/ Zeppelin, 6 – Parcela 38
37008 Carbajosa de La Sagrada
Salamanca, España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1309 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN
--

Lote {número}