

- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета (отбити прасета).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално.

30 mg парацетамол на kg телесна маса на ден, еквивалентно на 1.5 g прах за прилагане във вода за пиене на 10 kg телесна маса, докато свинете страдат от пирексия. Максимална продължителност на лечението: 5 дни.

Продуктът се прилага перорално продължително с водата за пиене. Приемът на медикаментозната вода зависи от клиничното състояние на животните. За да се постигне точно дозиране, концентрацията във водата за пиене трябва да се коригира в съответствие с инструкциите.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръка за разтваряне: поставете Pracetam 200 mg/g перорален прах във вода, за предпочитане топла (от 30 °C до 35 °C). Разбъркайте пет минути за да се хомогенизира медикаментозният разтвор. След това допълнете количеството вода в зависимост от необходимата концентрация и разклатете до получаване на хомогенен разтвор.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката след „EXP“.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 3 месеца.

Срок на годност след разтваряне във водата за пиене, съгласно указанията: 24 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При животни с намален прием на вода и/или увредено общо състояние трябва да се прилага парентерално.

В случай на комбинирана вирусна и бактериална етиология на заболяването, успоредно трябва да се прилага и подходяща антиинфекциозна терапия.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, маска и очила трябва да се носи когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт с кожата или очите, измийте с достатъчно количество вода. Ако симптомите продължат потърсете съвета на лекар.

За да се изключи рискът от поглъщане, се препоръчва да не се приемат храни или напитки по време на работа с продукта, както и да се измиват ръцете след прилагането.

При случайно поглъщане, разливане върху кожата или контакт с очите, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към paracetamol трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност и лактация:

Лабораторните проучвания при мишки и плъхове не показват никакви доказателства за тератогенност и фетотоксичност. Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при прилагането на продукта до 3 пъти над препоръчителната доза по време на бременност или лактация.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Продуктът да не се използва съвместно с потенциално нефротоксични продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След прием на 5 пъти по-висока от препоръчаната доза за парацетамол, в някои случаи се появяват редки изпражнения с твърди частици. Това не оказва въздействие върху общото състояние на животните.

При случайно предозиране може да се приложи ацетилцистеин.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

08/2018

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Размер на опаковката:

Торби по 1 kg, 5 kg и 10 kg.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Lot:

EXP:

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР