A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

MYOGASTER-E, 100 mg/ml – 1,315 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Alpha-Tocopherolacetat 100 mg
Natriumselenit anhydrisch 2 mg-(entspricht 0,6 mg Selen)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml und 100 ml.

4. ZIELTIERART(EN)

Kalb, Schwein und Schaf.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 0 Tage.
Milch: 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp.
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern. Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V137855

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Flasche, 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

MYOGASTER-E, 100 mg/ml – 1,315 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Alpha-Tocopherolacetat 100 mg
Natriumselenit anhydrisch 2 mg-(entspricht 0,6 mg Selen)

3. ZIELTIERART(EN)

Kalb, Schwein und Schaf.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Injektionslösung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 0 Tage.
Milch: 0 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp.
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern. Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche, 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

MYOGASTER-E



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Alpha-Tocopherolacetat 100 mg/ml,
Natriumselenit anhydrisch 2 mg-(entspricht 0,6 mg Selen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

4. VERFALLDATUM

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.