

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
{ŠKATLA}**

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Sprednja stran: ProtecTix 400 mg/2000 mg kožni nanos, raztopina za pse

Zadnja stran: ProtecTix 400 mg/2000 mg kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg do 40 kg

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 4,0-ml merilna kapalka vsebuje:

400 mg imidakloprida
2000 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 4,0 ml
2 x 4,0 ml
3 x 4,0 ml
4 x 4,0 ml
6 x 4,0 ml
12 x 4,0 ml
24 x 4,0 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



25 - 40 kg

5. INDIKACIJE

[Za škatle: to besedilo velja (samo) za sprednjo stran škatle.]

- Uničuje klope, bolhe in uši
- Odganja klope, komarje, peščene muhe in hlevske muhe
- Zmanjšuje tveganje prenosa pasje leišmanioze in erlihioze

Piktogrami šestih zajedavcev, tj. klopov, bolh, uši, komarjev, peščenih muh in hlevskih muh

[Za škatle: to besedilo velja (samo) za hrbtno stran škatle]

– Zdravljenje in preprečevanje bolh za 4 tedne; lahko se uporablja kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa na bolhe (FAD).

– Odpravlja pasje uši.

– Odvrča in uničuje klope za 3 do 4 tedne, odvisno od vrste klopa. Klopi, ki so že na psu, ni nujno, da bodo v dveh dneh po zdravljenju uničeni in lahko ostanejo pritrjeni in vidni. Zato je priporočljivo odstraniti klope, ki so ob zdravljenju že na psu, da bi preprečili njihovo pritrnitev in sesanje krvi.

– Odganja peščene muhe, komarje in hlevske muhe za 2 do 4 tedne.

– Zmanjšuje tveganje prenosa pasje leišmaniozne (do 3 tedne) in pasje erlihiozne (do 4 tedne).

6. POTI UPORABE

Uporaba z nanosom na kožo. Samo za zunanjo uporabo

Za zdravljenje enega psa uporabite eno merilno kapalko.



Zdravilo ostane učinkovito, če se pes zmoči. Zagotavlja larvicidni učinek proti bolham v neposredni okolici zdravljenih psov. Ne uporabite pri mladičih, mlajših od 7 tednov ali lažjih od 25 kg. V primeru brejosti ali laktacije uporabite le v skladu z nasvetom odgovornega veterinarja.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.



12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET



14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0801/004

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Vrečica}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProtecTix



2. KOLIČINA UČINKOVIN

400 mg Imidacloprid(e)

2000 mg Permethrin(e)

4,0 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}

Ko je merilna kapalka odprta, jo takoj uporabite.

beaphar®

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Merilna kapalka}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProtecTix



2. KOLIČINA UČINKOVIN

400 mg Imidacloprid(e)
2000 mg Permethrin(e) 4,0 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

beaphar[®]