

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Panacur Granules 222 mg/g granulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g granulių yra:

veikliosios medžiagos:

fenbendazolo 222 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Granulės.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms, užsikrėtusiems nesubrendusiais ir subrendusiais virškinamojo trakto ir plaučių nematodais, gydyti. Fenbendazolas ovicidiškai veikia nematodų kiaušinėlius ir kai kuriuos cestodus.

Šunims, užsikrėtusiems subrendusiais virškinimo trakto nematodais ir kaspinoočiais, gydyti.

Katėms, užsikrėtusioms nesubrendusiais ir subrendusiais virškinamojo trakto nematodais ir kaspinoočiais, gydyti.

Arkliams:

užsikrėtus didžiaisiais ir mažaisiais strongilais, askaridėmis, oksiuriais ir strongiloidais.

Galvijams:

užsikrėtus *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Capillaria* spp., *Dictyocaulus* spp. ir *Moniezia* spp.

Šunims:

užsikrėtus *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia* spp., *Oslerus osleri* ir *Giardia* spp.

Katėms:

užsikrėtus *Toxocara mystax* (subrendusiais), *Ancylostoma tubaeforme* (subrendusiais ir nesubrendusiais), *Taenia* spp. (subrendusiais) ir *Aelurostrongylus abstrusus*.

Šuniukams:

užsikrėtus *Toxocara* spp., *Trichuris* spp., *Ancylostoma* spp. ir *Giardia* spp., gydyti.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Būtina imtis priemonių toliau išvardytoms situacijoms išvengti, kadangi priešingu atveju gali padidėti atsparumo atsiradimo rizika ir galiausiai gydymas gali tapti neveiksmingas:

- per dažnai ir pakartotinai naudoti tos pačios klasės antihelmintikus ilgą laiką;
- naudoti nepakankamas dozes, kai neteisingai nustatomas kūno svoris, vaistas neteisingai naudojamas ar naudojamas nekalibruotas dozavimo prietaisas (jei toks naudojamas).

Įtariamus atsparumo antihelmintikams klinikinius atvejus reikėtų išaiškinti atliekant atitinkamus tyrimus (pvz., kiaušinėlių skaičiaus išmatose sumažėjimo tyrimą). Jei tyrimo (-ų) rezultatai rodo, kad yra didelė tikimybė, jog yra atsparumas tam tikram antihelmintikui, reikia naudoti antihelmintiką, kuris priklauso kitai farmakologinei klasei ir kurio veikimo mechanizmas yra skirtingas.

Nustatytas arklių ir galvijų virškinamojo trakto nematodų atsparumas benzimidazolams. Todėl vaisto naudojimas turi būti pagrįstas vietine epidemiologine informacija apie nematodų jautrumą ir rekomendacijomis, kaip riboti tolesnį atsparumo antihelmintikams vystymąsi.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Prieš apskaičiuojant vaisto dozę, būtina kiek įmanoma tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Tiesioginis sąlytis su oda turi būti minimalus.

Po naudojimo reikia plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai retais atvejais šunims ir katėms gali pasireikšti virškinamojo trakto sutrikimai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galvijai ir arkliai

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Šunys ir katės

Galima naudoti vaikingoms patelėms. Vis dėlto, kadangi labai retais atvejais teratogeninis poveikis šunims ir katėms negali būti visiškai atmestas, gydymas pirmųjų dviejų vaikingumo trečdalių metu turi būti pagrįstas tik atsakingo veterinarijos gydytojo atliktu naudos ir rizikos santykio įvertinimu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Skirti tik per burną.

Norint užtikrinti tinkamą dozavimą, būtina kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Vaistą reikia sušerti, sumaišius su gyvūno ėdesiu.

Galvijai ir arkliai

Įprastinė dozė yra 7,5 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio (atitinka 5 g Panacur Granules 150 kg kūno svorio). Žindantiems viduriuojantiems kumeliukams, užsikrėtusiems *Strongyloides westeri*, reikia skirti 50 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio. Gleivinėje esant incistavusioms mažųjų strongilų lervoms, reikalinga fenbendazolo dozė – 7,5 mg/kg kūno svorio skiriant 5 dienas iš eilės.

Šunys ir katės

Įprastinė dozė yra 50 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio per dieną skiriant 3 dienas iš eilės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Benzimidazolai turi dideles saugumo ribas. Nenustatyta jokių specifinių perdozavimo simptomų. Jokių specifinių veiksmų imtis nereikia.

4.11. Išlauka

Galvijienai ir subproduktams – 9 paros, arklienai ir subproduktams – 5 paros, karvių pienui – 4 paros.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antihelminčiai, benzimidazolo dariniai – fenbendazolas.
ATCvet kodas: QP52AC13.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fenbendazolas yra antihelminčikas, priklausantis benzimidazolo-karbamatų grupei. Jis sutrikdo nematodų energijos apykaitą.

Antihelminčikas veikia tiek suaugusius, tiek ir nesubrendusius virškinamojo trakto ir plaučių nematodus. Antihelminčinis veiksmingumas yra pagrįstas tubulino polimerizacijos slopinimu mikrotubulėse.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Patekęs į virškinimo traktą, jis iš dalies absorbuojamas ir biotransformuojamas kepenyse. Duoto *per os* fenbendazolo pusinės eliminacijos laikas iš galvijų kraujo serumo yra 10–18 val., avių – 21–33 val., kiaulių – 10 val. Fenbendazolas ir jo metabolitai pasiskirsto organizme, bet daugiausia kaupiasi kepenyse. Daugiau kaip 90 % fenbendazolo ir metabolitų iš organizmo išsiskiria su išmatomis, mažiau – su šlapimu ir pienu.

Fenbendazolas biotransformuojamas į sulfoksidus, po to į sulfonus ir aminos.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozės monohidratas,
kukurūzų krakmolas,
povidonas.

6.2. Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polietilenu dengti aliuminio-celiuliozės folijos pakeliai po 1 g (kartoninėse dėžutėse po 100 vnt.) ir po 1,8 ir 4,5 g (kartoninėse dėžutėse po 3 vnt.) (pakuotė skirta tik šunims ir katėms).

Polietilininės talpyklės po 1 kg (tik arkliams ir galvijams).

Polietilininės statinės po 50 kg (tik arkliams ir galvijams).

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Panacur Granules negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer,
Nyderlandai

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/02/1415/001-005

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2002-05-03.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007-06-11.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2016-05-23

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ (100 x 1 g, 3 x 1,8 g, 3 x 4,5 g)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Panacur Granules 222 mg/g granulės

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g granulių yra:

veikliosios medžiagos:

fenbendazolo

222 mg.

3. VAISTO FORMA

Granulės

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 x 1 g

3 x 1,8 g

3 x 4,5 g

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunims ir katėms.

6. INDIKACIJA (-OS)

Šunims, užsikrėtusiems *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia* spp., *Oslerus osleri* ir *Giardia* spp., gydyti.

Katėms, užsikrėtusioms *Toxocara mystax* (subrendusiais), *Ancylostoma tubaeforme* (subrendusiais ir nesubrendusiais), *Taenia* spp. (subrendusiais) ir *Aelurostrongylus abstrusus*, gydyti.

Šuniukams, užsikrėtusiems *Toxocara* spp., *Trichuris* spp., *Ancylostoma* spp. ir *Giardia* spp., gydyti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Skirti tik per burną.

Vaistą reikia sušerti, sumaišius su ėdesiu.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxtmeer,
Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/02/1415/001

LT/2/02/1415/002

LT/2/02/1415/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Pakelis (1 g, 1,8 g, 4,5 g)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Panacur Granules 222 mg/g granulės

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

1 g granulių yra 222 mg fenbendazolo.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 g
1,8 g
4,5 g

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Skirti tik per burną.
Sušerti sumaišius su ėdesiu.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Polietileninė talpyklė (1 kg) ir statinė (50 kg)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Panacur Granules 222 mg/g granulės

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g granulių yra:

veikliosios medžiagos:

fenbendazolo 222 mg.

3. VAISTO FORMA

Granulės

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 kg

50 kg

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliams, galvijams.

6. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, užsikrėtusiems didžiaisiais ir mažaisiais strongilais, askaridėmis, oksiuriais ir strongiloidais, gydyti.

Galvijams, užsikrėtusiems *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Capillaria* spp., *Dictyocaulus* spp. ir *Moniezia* spp., gydyti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Skirti tik per burną.

Vaistą reikia sušerti, sumaišius su pašaru.

8. IŠLAUKA

Išlauka: galvijienai ir subproduktams – 9 paros, arklienai ir subproduktams – 5 paros, karvių pienui – 4 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxtmeer,
Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/02/1415/004
LT/2/02/1415/005

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
Panacur Granules 222 mg/g granulės

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer,
Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Intervet GesmbH,
Siemensstrasse 107,
1210 Wien,
Austrija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Panacur Granules 222 mg/g granulės

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g granulių yra:

veikliosios medžiagos:

fenbendazolo 222 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms, užsikrėtusiems nesubrendusiais ir subrendusiais virškinamojo trakto ir plaučių nematodais, gydyti. Fenbendazolas ovicidiškai veikia nematodų kiaušinėlius ir kai kuriuos cestodus.

Šunims, užsikrėtusiems subrendusiais virškinimo trakto nematodais ir kaspinočiais, gydyti.

Katėms, užsikrėtusioms nesubrendusiais ir subrendusiais virškinamojo trakto nematodais ir kaspinočiais, gydyti.

Arkliams:

užsikrėtus didžiaisiais ir mažaisiais strongilais, askaridėmis, spalinėmis ir strongiloidais.

Galvijams:

užsikrėtus *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Capillaria* spp., *Dictyocaulus* spp. ir *Moniezia* spp.

Šunims:

užsikrėtus *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia* spp., *Oslerus osleri* ir *Giardia* spp.

Katėms:

užsikrėtus *Toxocara mystax* (subrendusiais), *Ancylostoma tubaeforme* (subrendusiais ir nesubrendusiais), *Taenia* spp. (subrendusiais) ir *Aelurostrongylus abstrusus*.

Šuniukams:

užsikrėtus *Toxocara* spp., *Trichuris* spp., *Ancylostoma* spp. ir *Giardia* spp.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais šunims ir katėms gali pasireikšti virškinamojo trakto sutrikimai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirti tik per burną.

Vaistą reikia sušerti, sumaišius su gyvūno ėdesiu.

Galvijai ir arkliai

Įprastinė dozė yra 7,5 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio (atitinka 5 g Panacur Granules 150 kg kūno svorio). Žindantiems viduriuojantiems kumeliukams, užsikrėtusiems *Strongyloides westeri*, reikia skirti 50 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio. Gleivinėje esant incistavusioms strongilų lervoms, reikalinga fenbendazolo dozė – 7,5 mg/kg kūno svorio skiriant 5 dienas iš eilės.

Šunys ir katės

Įprastinė dozė yra 50 mg fenbendazolo 1 kg kūno svorio per dieną skiriant 3 dienas iš eilės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norint užtikrinti tinkamą dozavimą, būtina kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

10. IŠLAUKA

Galvijienai ir subproduktams – 9 paros, arklienai ir subproduktams – 5 paros, karvių pienui – 4 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Būtina imtis priemonių toliau išvardytoms situacijoms išvengti, kadangi priešingu atveju gali padidėti atsparumo atsiradimo rizika ir galiausiai gydymas gali tapti neveiksmingas:

-per dažnai ir pakartotinai naudoti tos pačios klasės antihelmintikus ilgą laiką;

-naudoti nepakankamas dozes, kai neteisingai nustatomas kūno svoris, vaistas neteisingai naudojamas ar naudojamas nekalibruotas dozavimo prietaisas (jei toks naudojamas).

Įtariamus atsparumo antihelmin tikams klininius atvejus reikėtų išaiškinti atliekant atitinkamus tyrimus (pvz., kiaušinėlių skaičiaus išmatose sumažėjimo tyrimą). Jei tyrimo(-ų) rezultatai rodo, kad yra didelė tikimybė, jog yra atsparumas tam tikram antihelmin tikui, reikia naudoti antihelmin tiką, kuris priklauso kitai farmakologinei klasei ir kurio veikimo mechanizmas yra skirtingas.

Nustatytas arklių ir galvijų virškinamojo trakto nematodų atsparumas benzimidazolams. Todėl vaisto naudojimas turi būti pagrįstas vietine epidemiologine informacija apie nematodų jautrumą ir rekomendacijomis, kaip riboti tolesnį atsparumo antihelmin tikams vystymąsi.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Tiesioginis sąlytis su oda turi būti minimalus.

Po naudojimo reikia plauti rankas.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Prieš apskaičiuojant vaisto dozę, būtina kiek įmanoma tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Vaikingumas ir laktacija

Galvijai ir arkliai

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Šunys ir katės

Galima naudoti vaikingoms patelėms. Vis dėlto, kadangi labai retais atvejais teratogeninis poveikis šunims ir katėms negali būti visiškai atmestas, gydymas pirmųjų dviejų vaikingumo trečdalių metu turi būti pagrįstas tik atsakingo veterinarijos gydytojo atliktu naudos ir rizikos santykio įvertinimu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

Perdozavimas

Benzimidazolai turi dideles saugumo ribas. Nenustatyta jokių specifinių perdozavimo simptomų. Jokių specifinių veiksmų imtis nereikia.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Panacur Granules negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2016-04-06

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.