

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo 1,23 g ārstnieciskā kaklasiksna kaķiem un maza auguma suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 38 cm (12,5 g) kaklasiksna satur:

Aktīvās vielas:

Propoksūrs 1,23 g

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs
Dibutiladipāts
Propilēnglikola oktanoāta dekanoāts
Epoksidēta sojas pupu eļļa
Stearīnskābe
Titāna dioksīds (E171)
Dzelzs oksīda hidrāts (E172)
Dzelzs (III) oksīds (E172)
Dzelzs (II,III) oksīds (E172)
Polivinilhlorīds

Brūna kaklasiksna.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Kaķi, suņi.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma suņiem.

Šo veterināro zāļu iedarbība pret blusām ilgst līdz 4 mēnešiem un ērcēm ilgst līdz 10 nedēļām.

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

Nelietot kaķiem un suņiem līdz 3 mēnešu vecumam.

Nelietot slīmiem dzīvniekiem (jo īpaši, ja ir mehāniski gremošanas orgānu vai urīnizvadorgānu nosprostojumi, bronhiālā astma vai citas plaušu un asinsrites sistēmas slimības) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēti plaši ādas bojājumi.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanās iespēju pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai izvairītos no blusu atkārtotas invāzijas, dzīvnieka gulvietas un vietas, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklājus un mīkstās mēbeles, regulāri apstrādāt ar piemērotu insekticīdu un tīrīt ar putekļusūcēju.

Ārstnieciskā kaklasiksna paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

Noņemt ārstniecisko kaklasiksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal uzlikt ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana) var mazināt ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas laikā lietot cimdus. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izvairīties no pārmērīgas saskares ar ārstniecisko kaklasiksnu, un pēc pieskaršanās ārstnieciskajai kaklasiksnei rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret propoksūru, vai pret jebkuru no palīgvielām, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Ja notikusi nejauša šīs ārstnieciskās kaklasiksnas saskare ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, nedzert, neēst vai nesmēķēt.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Sievietēm grūtniecības trešajā trimestrī jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Dzīvnieki, kuri valkā šo ārstniecisko kaklasiksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā ārstniecisko kaklasiksnu. Neļaut rotaļāties ar kaklasiksnu, sevišķi bērniem. Neļaut sūkāt un košļāt ārstniecisko kaklasiksnu, sevišķi bērniem.

Ārstam:

Ja parādās saindēšanās klīniskās pazīmes ar karbamātu, veikt simptomātisku ārstēšanu un intravenozi ievadīt antidotu atropīnu.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Aktīvā viela propoksūrs ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs veterinārās zāles var izraisīt ilgstošu nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi. Dzīvnieki, kuriem uzlikta ārstnieciskā kaklasiksna, nedrīkst iekļūt ūdenstilpēs.

3.6. Blakusparādības

Kaķi, suņi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Kairinājums lietošanas vietā ¹ , nieze lietošanas vietā ¹
---	---

¹ Novērots ļoti jutīgiem dzīvniekiem, īpaši pirmajās dienās pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, ārstniecisko kaklasiksnu noņemt, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama specifiska ārstēšana.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība:

Laboratoriskajos pētījumos dažādām dzīvnieku sugām netika konstatēta jebkāda nevēlama iedarbība grūsnības laikā. Karbamāti var izraisīt gludās muskulatūras kontrakcijas. Tāpēc šīs veterinārās zāles nelietot dzīvniekiem grūsnības beigu posmā.

Laktācija:

Nelietot kucēm un kaķenēm laktācijas laikā.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem vai akaricīdiem.

3.9. Lietošanas veids un devas

Lietošanai uz ādas.

Lietošana: uzlikt vienu ārstniecisko kaklasiksnu ap dzīvnieka kaklu.

Izņemt ārstniecisko kaklasiksnu no hermetizētā iepakojuma, atritināt un noņemt plastikāta loksnītes no ārstnieciskās kaklasiksnas iekšpusēs. Uzlikt ārstniecisko kaklasiksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogriezt pāri palikušo ārstnieciskās kaklasiksnas galu. Ārstniecisko kaklasiksnu nesavilkt pārāk cieši vai neatstāt pārāk brīvi (ieteicams, lai starp ārstniecisko kaklasiksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Pirmajās dienās pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas pārbaudīt dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem ārstnieciskās kaklasiksnas nospiedums var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudīt ārstnieciskās kaklasiksnas ciešumu.

Ārstnieciskā kaklasiksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas brīža. Piesūkušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli noņemt, vai arī ērces pēkšņi nokrīt pašas. Retos gadījumos ērcu piesūkšanās var notikt ārstnieciskās kaklasiksnas lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras ādai un nokrīt, parasti bez asiņu sūkšanas.

Ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitātes ilgumu nosaka dzīvnieka apmatojuma garums un stāvoklis, dzīvnieka aktivitātes pakāpe un parazītu invāzija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti, dzīvniekus ar raupju, savēlušos vai netīru apmatojumu vajadzētu nomazgāt ar šampūnu pirms ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Ja ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemt ārstniecisko kaklasiksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal uzlikt ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanas, mazgāšana) var mazināt ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti.

Blusu invāzijas gadījumā visus mājdzīvniekus esošos dzīvniekus apstrādāt ar piemērotu, reģistrētu insekticīdu.

Ieteikums pareizai lietošanai:

Papildu blusām, kuras invadējušas suņus un kaķus, arī apkārtnē var būt piesārņota ar blusu olniņām, kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti, ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Nepastāv pārdozēšanas risks. Nejaušas ārstnieciskās kaklasiksnas norīšanas gadījumā var parādīties tādas karbamātu saindēšanās pazīmes kā pastiprināta siekalošanās, mioze, vemšana vai diareja. Ja parādās simptomi, kas norāda uz saindēšanos ar karbamātiem, nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību un veikt simptomātisku ārstēšanu un intravenozi ievadīt antidotu – atropīnu.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATKvet kods: QP53AE02

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) ir karbamīnskābes grupas pretektoparazītu līdzeklis. Propoksūrs iedarbojas, inhibējot holīnesterāzi, kā rezultātā notiek toksiska neirotransmitera acetilholīna akumulācija holīnerģisko nervu galos. Tas nogalina blusas un ērces. Toksicitāte zīdītājdzīvniekiem tomēr ir ļoti zema.

Ārstnieciskā kaklasiksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas brīža, un tās iedarbība turpinās vairākus mēnešus.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Nav pierādījumu par aktīvās vielas jebkādu būtisku sistēmisku iedarbību.

Ietekme uz vidi

Šīs veterinārās zāles ir ārkārtīgi toksiskas ūdens organismiem, putniem un bitēm.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav piemērojama.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 5 gadi.
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Poliestera-polietilēna folijas maisiņš, kas satur vienu ārstniecisko kaklasiksnu, iepakots kartona kastītē.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo propoksūrs var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Elanco Animal Health GmbH

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/NRP/99/0982

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 25/06/1999

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2025

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS

MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

KARTONA KASTĪTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo 1,23 g ārstnieciskā kaklasiksna kaķiem un maza auguma suņiem

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra 38 cm (12,5 g) kaklasiksna satur:

Propoksūrs 1,23 g

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 x 38 cm kaklasiksna

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi, suņi.

5. INDIKĀCIJAS

Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma suņiem.

Šo veterināro zāļu iedarbība pret blusām ilgst līdz 4 mēnešiem un ērcēm ilgst līdz 10 nedēļām.



Ērces



Blusas

6. LIETOŠANAS VEIDI

Lietošanai uz ādas.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

Elanco 

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

V/NRP/99/0982

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

FOLIJAS PACIŅA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

Propoxurum 1,23 g

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Bolfo 1,23 g ārstnieciskā kaklasiksna kaķiem un maza auguma suņiem

2. Sastāvs

Katra 38 cm (12,5 g) kaklasiksna satur:

Aktīvās vielas:

Propoksūrs 1,23 g

Brūna kaklasiksna.

3. Mērķsugas

Kaķi, suņi.

4. Lietošanas indikācijas

Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma suņiem.

Šo veterināro zāļu iedarbība pret blusām ilgst līdz 4 mēnešiem un ērcēm ilgst līdz 10 nedēļām.

5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

Nelietot kaķiem un suņiem līdz 3 mēnešu vecumam.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (jo īpaši, ja ir mehāniski gremošanas orgānu vai urīnizvadorgānu nosprostojumi, bronhiālā astma vai citas plaušu un asinsrites sistēmas slimības) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēti plaši ādas bojājumi.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanās iespēju pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai izvairītos no blusu atkārtotas invāzijas, dzīvnieka gulvietas un vietas, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklājus un mīkstās mēbeles, regulāri apstrādāt ar piemērotu insekticīdu un tīrīt ar putekļusūcēju.

Ārstnieciskā kaklasiksna paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

Noņemt ārstniecisko kaklasiksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal uzlikt ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana) var mazināt ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas laikā lietot cimdus.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izvairīties no pārmērīgas saskares ar ārstniecisko kaklasiksnu,

un pēc pieskaršanās ārstnieciskajai kaklasiksnei, rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret propoksūru, vai pret jebkuru no palīgvielām, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Ja notikusi nejauša šīs ārstnieciskās kaklasiksnas saskare ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, nedzert, neēst vai nesmēķēt.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Sievietēm grūtniecības trešajā trimestrī jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Dzīvnieki, kuri valkā šo ārstniecisko kaklasiksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā ārstniecisko kaklasiksnu. Neļaut rotaļāties ar ārstniecisko kaklasiksnu, sevišķi bērniem. Neļaut sūkāt un košļāt ārstniecisko kaklasiksnu, sevišķi bērniem.

Ārstam:

Ja parādās saindēšanās klīniskās pazīmes ar karbamātu, veikt simptomātisku ārstēšanu un intravenozi ievadīt antidotu atropīnu.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Aktīvā viela propoksūrs ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs veterinārās zāles var izraisīt ilgstošu nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi. Dzīvnieki, kuriem uzlikta ārstnieciskā kaklasiksna, nedrīkst iekļūt ūdenstilpēs.

Grūsnība:

Laboratoriskajos pētījumos dažādām dzīvnieku sugām netika konstatēta jebkāda nevēlama iedarbība grūsnības laikā. .

Karbamāti var izraisīt gludās muskulatūras kontrakcijas. Tāpēc šīs veterinārās zāles nelietot dzīvniekiem grūsnības beigu posmā.

Laktācija:

Nelietot kucēm un kaķenēm laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem vai akaricīdiem.

Pārdozēšana:

Nepastāv pārdozēšanas risks. Nejaušas ārstnieciskās kaklasiksnas norīšanas gadījumā var parādīties tādas karbamātu saindēšanās pazīmes, kā pastiprināta siekalošanās, mioze, vemšana vai diareja. Ja parādās simptomi, kas norāda uz saindēšanos ar karbamātiem, nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību un veikt simptomātisku ārstēšanu un intravenozi ievadīt antidotu – atropīnu.

7. Blakusparādības

Kaķi, suņi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): Kairinājums lietošanas vietā ¹ , nieze lietošanas vietā ¹

¹ Novērots ļoti jutīgiem dzīvniekiem, īpaši pirmajās dienās pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, ārstniecisko kaklasiksnu noņemt, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama specifiska ārstēšana.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī

tirdzniecības atļaujas turētājam, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu:

<https://www.pvd.gov.lv/lv>.

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Lietošanai uz ādas.

Lietošana: uzlikt vienu ārstniecisko kaklasiksnu ap dzīvnieka kaklu.

Izņemt ārstniecisko kaklasiksnu no hermetizētā iepakojuma, atritināt un noņemt plastikāta loksnītes no ārstnieciskās kaklasiksnas iekšpuses. Uzlikt ārstniecisko kaklasiksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogriezt pāri palikušo ārstnieciskās kaklasiksnas galu. Ārstniecisko kaklasiksnu nesavilkt pārāk cieši vai neatstāt pārāk brīvi (ieteicams, lai starp ārstniecisko kaklasiksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Ārstnieciskā kaklasiksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas brīža. Piesūkušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli noņemt, vai arī ērces pēkšņi nokrīt pašas. Retos gadījumos ērcu piesūkšanās var notikt ārstnieciskās kaklasiksnas lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras ādai un nokrīt, parasti bez asiņu sūkšanas.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Pirmajās dienās pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas pārbaudīt dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem ārstnieciskās kaklasiksnas nospiedums var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudīt ārstnieciskās kaklasiksnas ciešumu.

Ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitātes ilgumu nosaka dzīvnieka apmatojuma garums un stāvoklis, dzīvnieka aktivitātes pakāpe un parazitāru invāzija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti, dzīvniekus ar raupju, savēlušos vai netīru apmatojumu vajadzētu nomazgāt ar šampūnu pirms ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Ja ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemt ārstniecisko kaklasiksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal uzlikt ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana) var mazināt ārstnieciskās kaklasiksnas efektivitāti.

Blusu invāzijas gadījumā visus mājssaimniecībā esošos dzīvniekus apstrādāt ar piemērotu, reģistrētu insekticīdu.

Papildu blusām, kuras invadējušas suņus un kaķus, arī apkārtnē var būt piesārņota ar blusu olniņām, kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti, ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu pieķeršanās iespēju pēc ārstnieciskās kaklasiksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvieta un vietas, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklājus un mīkstās mēbeles, regulāri apstrādāt ar piemērotu insekticīdu un tīrīt ar putekļsūcēju.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes a pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, propoksūrs var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/NRP/99/0982

Poliestera-polietilēna folijas maisiņš, kas satur vienu ārstniecisko kaklasiksnu, iepakots kartona kastītē.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

09/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Vācija

Tel: +372 8840390

E-mail: PV.LVA@elancoah.com

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel,

Vācija