

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT – 250-ml-, 500-ml-, 1-Liter- und 2,5-Liter-Behälter****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dectospot 10 mg/ml Lösung zum Übergießen

**2. WIRKSTOFF(E)**

Deltamethrin 10 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder und Schafe.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG****Pour-on-Anwendung (zum Übergießen)**

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 18 Tage

Milch: null Stunden

Schafe:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: 24 Stunden

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination von nicht behandelten Tieren mit diesem Tierarzneimittel durch Kraulen (Belecken) sollten behandelte Tiere während der maximalen Wartezeit von nicht behandelten Tieren getrennt gehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlung kann bei unbehandelten Tieren zu Rückständen führen.

**6. VERFALLDATUM**

EXP: MM/JJJJ

Das Tierarzneimittel muss innerhalb von 3 Monaten nach Öffnen des Behältnisses verbraucht werden.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Aufrecht im Originalbehältnis aufbewahren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTON– 250-ml-, 500-ml-, 1-Liter- und 2,5-Liter-Behälter****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dectospot 10 mg/ml Lösung zum Übergießen

**2. WIRKSTOFF(E)**

Deltamethrin 10 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml  
500 ml  
1 Liter  
2,5 Liter

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder und Schafe.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG****Pour-on-Anwendung (zum Übergießen).**

Nur für äußere Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 18 Tage

Milch: null Stunden

Schafe:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: 24 Stunden

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination von unbehandelten Tieren mit diesem Tierarzneimittel durch Fellpflege (Lecken) sollten behandelte und unbehandelte Tiere während der maximalen Wartezeit getrennt gehalten werden. Nichtbefolgung dieser Empfehlung kann zu Rückständen bei unbehandelten Tieren führen.

**8. VERFALLDATUM**

EXP: MM/JJJJ

Das Tierarzneimittel muss innerhalb von 3 Monaten nach Öffnen des Behältnisses verbraucht werden.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Aufrecht im Originalbehältnis aufbewahren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V499182

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}