

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINIVitamin AD₃E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke**2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI**

1 ml emulzije za injiciranje vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

vitamin A	50.000 IE
holekalciferol (vitamin D)	25.000 IE
tokoferilacetat (vitamin E)	20 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Za intramuskularno ali subkutano uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi:	0 dni
Mleko:	0 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP:
Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini.
Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0377/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI**ETIKETA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Vitamin AD₃E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml emulzije za injiciranje vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

vitamin A	50.000 IE
holekalciferol (vitamin D)	25.000 IE
tokoferilacetat (vitamin E)	20 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA**4. VELIKOST PAKIRANJA**

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Za intramuskularno ali subkutano uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 0 dni
Mleko: 0 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP:
Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini.
Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0377/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

NAVODILO ZA UPORABO

Vitamin AD₃E KRKA emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec odgovoren za sproščanje serij:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vitamin AD₃E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke

3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

1 ml emulzije za injiciranje vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

vitamin A	50.000 IE
holekalciferol (vitamin D)	25.000 IE
tokoferilacetat (vitamin E)	20 mg

Bistra do rahlo opalescentna, rumena, viskozna raztopina.

4. INDIKACIJE

- spodbujanje rasti in proizvodnosti živali,
- zvišanje odpornosti proti okužbam,
- izboljšanje splošnega stanja živali,
- zmanjšanje stresnih učinkov pri prevozu, preselitvi in podobnem,
- preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja vitaminov pri rahitisu, nutritivni sterilnosti in osteomalaciji ter med okrevanjem,
- motnje v prehrani.

5. KONTRAINDIKACIJE

Hipervitaminoze vitaminov A, D in E.

6. NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, prašiči, ovce, koze, kunci, psi in mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

Teleta, žrebeta

5 ml do 10 ml na žival

Konji, govedo	10 ml do 20 ml na žival
Plemenske svinje in merjasci	10 ml na žival
Prašiči (50 do 100 kg)	4 do 8 ml na žival
Ovce, koze	3 ml do 5 ml na žival
Jagnjeta, kozličiči, pujski	1 ml do 2 ml na žival
Kunci	1 ml na žival
Psi, mačke	2 ml do 4 ml na žival

Zdravilo dajemo intramuskularno ali subkutano.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravilo dajemo intramuskularno ali subkutano.

10. KARENCA

Meso in organi:	0 dni
Mleko:	0 dni

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte v originalni ovojnini.
Zaščitite pred svetlobo.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po {EXP}. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNA OPOZORILA

Pri psih in mačkah lahko posebno visoki odmerki vitamina A povzročijo zraščanje vretenc.

Večkratno prekoračenje terapijskega odmerka zdravila lahko izzove nalaganje kalcija v organizmu živali. Zelo redko lahko injekcijski pripravek vitaminov AD₃E izzove preobčutljivostne (anafilaktične) reakcije.

Zdravila ne priporočamo za uporabo pri živalih med laktacijo. Potrebna je previdnost pri aplikaciji zdravila živalim tri tedne pred parjenjem in v prvi tretjini brejosti zaradi možnega teratogenega učinka vitamina A.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO

26.8.2016

15. DRUGE INFORMACIJE

Na voljo so steklenice po 100 ml.