

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
IN NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

Škatla/50 ml steklenička

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Depedin Veyx suspenzija za injiciranje
prednizolonacetat, deksametazon

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml vsebuje:

Učinkovine:

prednizolonacetat	7,50 mg
deksametazon	2,50 mg

Pomožna snov:

benzilalkohol (E1519)	10,0 mg
-----------------------	---------

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, teleta, psi, mačke.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo, teleta:

Meso in organi: 10 dni.

Mleko: 2 dni.

Psi, mačke:
Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Kortikosteroidi lahko sprožijo porod v zadnji tretjini brejosti.
Pred vsako uporabo dobro pretresite.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).
Zdravila ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0083/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številk}