

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met 10 zakjes van 100 g

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Bacivet S, 4200 IU/g, poeder voor gebruik in drinkwater, konijnen.

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Bacitracine zink 4200 IU/g

3. VERPAKKINGSGROOTTE

Doos met 10 zakjes van 100 g.

4. DOELDIERSOORTEN

Konijn (vleeskonijnen)

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Poeder voor gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:
Vlees en slachtafval: 2 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Na opening van het sachet: direct gebruiken.
Na oplossing: 24 uur.

EXP (maand/jaar)

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN
BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

HUVEPHARMA NV

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V372425

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**100 g zakje vervaardigd uit lage dichtheid polyethyleen / aluminium / polyester bag****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bacivet S, 4200 IU/g, poeder voor gebruik in drinkwater, konijnen.

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Bacitracine zink 4200 IU/g

3. DOELDIERSOORTEN

Konijn (vleeskonijnen)

4. TOEDIENINGSWEGEN

Poeder voor gebruik in drinkwater.

Lees de bijsluiter voor gebruik

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. (mm/jjjj)

Na openen: direct gebruiken.

Na reconstitutie: 24 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Huvepharma NV

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}