

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 5, 5 mg compresse per cani e gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Megestrol acetato 5 mg

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse piatte, a sezione circolare, di colore da bianco a quasi bianco.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Nelle cagne: per la prevenzione e la posposizione del calore nonché per la terapia della falsa gravidanza

Nelle gatte: per la prevenzione e la posposizione del calore.

4.3 Controindicazioni

Non usare in:

- casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;
- soggetti sessualmente immaturi;
- femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- femmine affette da neoplasie mammarie;
- soggetti diabetici;
- soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non pertinente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non usare durante la gravidanza e l'allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Per uso orale.

Cagne

Posposizione del calore

¼ compressa/2,5 kg p.c./die per 30 giorni consecutivi.

Il trattamento va iniziato durante la fase di anestro (periodo di riposo sessuale): possibilmente 1-3 settimane prima della prevista comparsa delle prime manifestazioni di calore.

Prevenzione del calore

1 compressa/2,5 kg p.c./die per 8 giorni consecutivi.

Il trattamento va intrapreso non oltre il 3° giorno dall'inizio della fase di proestro (periodo che precede il calore, caratterizzato da: turgore della vulva, secrezione vulvare muco-emorragica, stato di irrequietezza, ecc.).

Terapia della falsa gravidanza

1 compressa/2,5 kg p.c./die per 10 giorni consecutivi.

Il trattamento va intrapreso non appena si notano i primi sintomi della falsa gravidanza e solo dopo aver eseguito un'appropriata diagnosi differenziale, onde evitare trattamenti non corretti.

Gatte

Posposizione del calore in fase anaestrale (periodo di riposo sessuale):

½ - 1 compressa/soggetto/settimana.

Il ciclo di trattamento può essere protratto per un periodo massimo di 18 mesi.

Posposizione del calore in fase diestrale (intervallo di tempo che intercorre tra 2 manifestazioni di calore di una stessa stagione):

½ compressa/soggetto/die, per 2 mesi.

Le compresse possono essere somministrate come tali o, previa riduzione in polvere, mescolate ad un po' di cibo

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Nel cane con l'uso prolungato del prodotto possono insorgere eventuali inconvenienti (vomito, inappetenza, metrorragie, falsa gravidanza, endometriti ghiandolari cistiche).

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: Contraccettivi ormonali sistemici, Progestinici.

Codice ATCvet: QG03AC05

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Estropill è una specialità medicinale ad attività contraccettiva presentata sotto forma di compresse orali.

Il megestrolo acetato è un progestinico di sintesi utilizzato per la regolazione del ciclo estrale nella cagna e nella gatta.

L'azione del megestrolo acetato sulla funzione ovarica risulta diversa a seconda della fase del ciclo sessuale in cui il farmaco viene impiegato:

- somministrato nel periodo immediatamente precedente la comparsa del calore (fase proestrale) provoca, a seguito dell'inibizione dell'ormone LH, il blocco dell'ovulazione e la mancata formazione del corpo luteo. Quest'azione del megestrolo acetato, associata al suo effetto antiestrogenico locale, determina la prevenzione sia del calore che delle manifestazioni, fisiche e comportamentali, ad esso correlate (fase estrale);

- se, invece, la somministrazione viene praticata nel periodo di riposo sessuale (fase anestrale, nella cagna e nella gatta) o nell'intervallo di tempo che intercorre tra 2 manifestazioni di calore di una stessa stagione (fase diestrane, nella gatta) si ha, per l'inibizione della produzione del FSH, un arresto nello sviluppo follicolare e nella produzione di estrogeni. Ciò determina la posposizione della fase estrale.

Nella cagna e nella gatta il megestrolo acetato, somministrato per via orale, alle dosi e per i tempi consigliati, è in grado, pertanto, di mantenere i soggetti trattati in uno stato di quiescenza sessuale per tutta la durata del trattamento e, dopo la sua sospensione, per un periodo di tempo variabile (in genere 4-6 mesi) in funzione della fase del ciclo sessuale in cui esso viene effettuato.

Oltre all'attività contraccettiva, il megestrolo acetato è in grado di esplicare anche un'azione psicotropa, influenzando l'area cerebrale denominata nel suo complesso "sistema limbico". Questa particolare attività farmacologica può essere utilizzata nella terapia di alcune forme patologiche del cane o del gatto di origine psicosomatica o neuroormonale.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Il megestrolo acetato somministrato per via orale viene assorbito molto velocemente: ciò determina la necessità di doverlo somministrare quotidianamente per mantenere a livello plasmatico concentrazioni di farmaco che risultano in grado di esplicare un'efficace attività farmacologica.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Lattosio
Amido
Magnesio stearato

6.2 Incompatibilità principali

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Proteggere dalla luce.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Astuccio contenente 32 compresse da 5 mg di megestrolo acetato, in blister in PVC e foglio di alluminio.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Intervet Productions S.r.l., Via Nettunense km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Astuccio contenente 32 compresse - A.I.C. n. 102063029

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 giugno 1976

Data dell'ultimo rinnovo: 01 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DELTESTO

Marzo 2022

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Astuccio contenente 32 compresse da 5 mg in blister

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 5, 5 mg compresse per cani e gatti
Megestrol acetato

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Ogni compressa contiene: megestrol acetato 5 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse

4. CONFEZIONI

32 compresse

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

6. INDICAZIONI(I)

Leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA**9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD { mese/anno }

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km. 20,300

04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l. - Segrate (MI)

16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102063029

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto {numero}



Spazio per posologia

Spazio per codice a lettura ottica DM 17/12/2007

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI BLISTER O SUGLI STRIPS

Blister da 32 compresse

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 5, 5 mg compresse per cani e gatti
Megestrol acetato

2. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

3. DATA DI SCADENZA

Scad {mese/anno}

4. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

5. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

- soggetti sessualmente immaturi;
- femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- femmine affette da neoplasie mammarie;
- soggetti diabetici;
- soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

6. REAZIONI AVVERSE

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

Cagne

Posposizione del calore

¼ compressa/2,5 kg p.c./die per 30 giorni consecutivi.

Il trattamento va iniziato durante la fase di anestro (periodo di riposo sessuale): possibilmente 1-3 settimane prima della prevista comparsa delle prime manifestazioni di calore.

Prevenzione del calore

1 compressa/2,5 kg p.c./die per 8 giorni consecutivi.

Il trattamento va intrapreso non oltre il 3° giorno dall'inizio della fase di proestro (periodo che precede il calore, caratterizzato da: turgore della vulva, secrezione vulvare muco-emorragica, stato di irrequietezza, ecc.).

Terapia della falsa gravidanza

1 compressa/2,5 kg p.c./die per 10 giorni consecutivi.

Il trattamento va intrapreso non appena si notano i primi sintomi della falsa gravidanza e solo dopo aver eseguito un'appropriata diagnosi differenziale, onde evitare trattamenti non corretti.

Gatte

Posposizione del calore in fase anaestrale (periodo di riposo sessuale):

½ - 1 compressa/soggetto/settimana.

Il ciclo di trattamento può essere protratto per un periodo massimo di 18 mesi.

Posposizione del calore in fase diestrale (intervallo di tempo che intercorre tra 2 manifestazioni di calore di una stessa stagione):

½ compressa/soggetto/die, per 2 mesi.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le compresse possono essere somministrate come tali o, previa riduzione in polvere, mescolate ad un po' di cibo.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Proteggere dalla luce.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non pertinente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Gravidanza e allattamento:

Non usare durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio:

Nel cane con l'uso prolungato del prodotto possono insorgere eventuali inconvenienti (vomito, inappetenza, metrorragie, falsa gravidanza, endometriti ghiandolari cistiche).

Incompatibilità principali:

Non pertinente.

13. PRECAUZIONI SPECIALI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Marzo 2022

15. ALTRE INFORMAZIONI

Estropill 5 è una specialità medicinale ad attività contraccettiva presentata sotto forma di compresse orali.

Il megestrolo acetato è un progestinico di sintesi utilizzato per la regolazione del ciclo estrale nella cagna e nella gatta.

L'azione del megestrolo acetato sulla funzione ovarica risulta diversa a seconda della fase del ciclo sessuale in cui il farmaco viene impiegato:

- somministrato nel periodo immediatamente precedente la comparsa del calore (fase proestrale) provoca, a seguito dell'inibizione dell'ormone LH, il blocco dell'ovulazione e la mancata formazione del corpo luteo. Quest'azione del megestrolo acetato, associata al suo effetto antiestrogenico locale, determina la prevenzione sia del calore che delle manifestazioni, fisiche e comportamentali, ad esso correlate (fase estrale);

- se, invece, la somministrazione viene praticata nel periodo di riposo sessuale (fase anestrade, nella cagna e nella gatta) o nell'intervallo di tempo che intercorre tra 2 manifestazioni di calore di una stessa stagione (fase diestrade, nella gatta) si ha, per l'inibizione della produzione del FSH, un arresto nello sviluppo follicolare e nella produzione di estrogeni. Ciò determina la posposizione della fase estrale.

Nella cagna e nella gatta il megestrolo acetato, somministrato per via orale alle dosi e per i tempi consigliati, è in grado, pertanto, di mantenere i soggetti trattati in uno stato di quiescenza sessuale per tutta la durata del trattamento e, dopo la sua sospensione, per un periodo di tempo variabile (in genere 4-6 mesi) in funzione della fase del ciclo sessuale in cui esso viene effettuato.

Oltre all'attività contraccettiva, il megestrolo acetato è in grado di esplicare anche un'azione psicotropa, influenzando l'area cerebrale denominata nel suo complesso "sistema limbico".

Questa particolare attività farmacologica può essere utilizzata nella terapia di alcune forme patologiche del cane o del gatto di origine psicosomatica o neurormonale.

Confezioni:

Astuccio contenente 4 blister da 8 compresse da 5 mg.

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non pertinente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non usare durante la gravidanza e l'allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Per uso orale.

Estropill può essere utilizzato per:

Prevenire il calore:

La somministrazione deve iniziare appena si presentano i primi sintomi di calore (ingrossamento della vulva, perdite muco-emorragiche, etc.). La dose da impiegare è di 2 mg di principio attivo per kg di peso corporeo al giorno per 8 giorni consecutivi.

I segni dell'estro scompaiono nell'arco di 3-4 giorni. L'estro successivo compare entro un periodo variabile in relazione ai normali cicli del soggetto trattato.

Posporre il calore:

Tale sistema si consiglia quando si desidera che l'animale non entri in calore per un certo periodo di tempo in relazione a particolari eventi (mostre canine, periodi di caccia, viaggi molto lunghi, necessità di lasciare l'animale in custodia in un canile, etc.). In tali casi il

dosaggio da impiegare è di 0,5 mg di principio attivo per kg di peso corporeo al giorno per 30 giorni consecutivi. Il periodo di assenza del calore inizia al 7° giorno di somministrazione e si prolunga per un periodo variabile che, comunque, è improbabile che superi i sei mesi. Tale sistema di somministrazione può essere effettuato anche routinariamente, ma non dovrebbe essere ripetuto più di una volta ogni sei mesi.

Trattare la falsa gravidanza:

La somministrazione deve iniziare non appena si notano i primi sintomi della falsa gravidanza. Il dosaggio è di 2 mg di principio attivo per kg di peso vivo per 10 giorni consecutivi. Dopo il 3° giorno si assiste a una regressione delle manifestazioni comportamentali e fisiche della falsa gravidanza. Si potrà fare ricorso al trattamento solo dopo una effettiva diagnosi differenziale, allo scopo di evitare trattamenti non corretti.

Peso del cane	Compresse da 20 mg di principio attivo al dì		Compresse da 5 mg di principio attivo al dì		Durata del trattamento (giorni)	
	Prevenzione del calore		Prevenz. calore	Posposiz. calore	Prev.ne	Posp.ne
2,5 kg	¼	oppure	1	¼	8	30
5 kg	½	“	2	½	“	“
7,5 kg	1	“	3	¾	“	“
10 kg	1	“	4	1	“	“
12,5 kg	1 ½	“	5	1 ¼	“	“
15 kg	1 ½	“	6	1 ½	“	“
17,5 kg	2	“	7	1 ¾	“	“
20 kg	2	“	8	2	“	“
22,5 kg	2 ½	“	9	2 ¼	“	“
25 kg	2 ½	“	10	2 ½	“	“
27,5 kg	3	“	11	2 ¾	“	“
30 kg	3	“	12	3	“	“
32,5 kg	3 ½	“	13	3 ¼	“	“
35 kg	3 ½	“	14	3 ½	“	“
37,5 kg	4	“	15	3 ¾	“	“
40 kg	4	“	16	4	“	“

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Con l'uso prolungato del prodotto possono insorgere eventuali inconvenienti (vomito, inappetenza, metrorragie, falsa gravidanza, endometriti ghiandolari cistiche).

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: Contraccettivi ormonali sistemici, Progestinici.
Codice ATCvet: QG03AC05.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Per la prevenzione e la posposizione del calore della cagna nonchè per la terapia della falsa gravidanza.

Estropill è costituito da uno dei più potenti progestinici sintetizzati fino ad oggi, che è in grado di determinare il blocco dell'ovulazione e la scomparsa del calore nella cagna.

Tale sostanza, che è attiva per via orale e del tutto priva di tossicità, è stata a lungo sperimentata nella donna e in numerose specie di animali senza aver mai dato luogo a effetti collaterali indesiderati.

La sua azione si realizza a livello delle ovaie impedendo la maturazione dell'ovulo ed evitando, quindi, la comparsa di tutte quelle manifestazioni fastidiose che accompagnano il calore della cagna.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Il megestrolo acetato somministrato per via orale viene assorbito molto velocemente: ciò determina la necessità di doverlo somministrare quotidianamente per mantenere a livello plasmatico concentrazioni di farmaco che risultano in grado di esplicare un'efficace attività farmacologica.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Lattosio

Amido

Magnesio stearato

6.2 Incompatibilità principali

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Proteggere dalla luce.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Astuccio contenente 8 compresse da 20 mg di megestrolo acetato, in blister in PVC e foglio di alluminio.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Intervet Productions S.r.l., Via Nettunense km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Astuccio contenente 8 compresse – A.I.C. n. 102063043

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 giugno 1976

Data dell'ultimo rinnovo: 01 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DELTESTO

Marzo 2022

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Astuccio contenente 8 compresse da 20 mg in blister

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20, 20 mg compresse per cani
Megestrol acetato

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Ogni compressa contiene: megestrol acetato 20 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Comprese

4. CONFEZIONI

8 compresse

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

6. INDICAZIONE(I)

Per la prevenzione e la posposizione del calore della cagna nonché per la terapia della falsa gravidanza.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA**9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD { mese/anno }

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
Via Nettunense Km. 20,300
04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:
MSD Animal Health S.r.l. - Segrate (MI)

16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102063043

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto {numero}



Spazio per posologia

Spazio per codice a lettura ottica DM 17/12/2007 INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI BLISTER O SUGLI STRIPS

Blister da 8 compresse

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20, 20 mg compresse per cani
Megestolo acetato

2. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

3. DATA DI SCADENZA

Scad {mese/anno}

4. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

5. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

ESTROPILL 20, 20 mg compresse per cani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Intervet Productions S.r.l.
Via Nettunense Km 20.300
04011 Aprilia (LT)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Intervet Productions S.r.l.
Via Nettunense Km 20.300
04011 Aprilia (LT)
oppure
Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
1210 Vienna (Austria)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l.
Strada di Olgia Vecchia snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova – 20054
Segrate (MI)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20, 20 mg compresse per cani
Megestrol acetato

3. INDICAZIONI DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Megestrol acetato 20 mg

Compresse piatte, a sezione circolare, di colore da bianco a quasi bianco.

4. INDICAZIONE(I)

Per la prevenzione e la posposizione del calore della cagna nonché per la terapia della falsa gravidanza.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in:

- casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;

- soggetti sessualmente immaturi;
- femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- femmine affette da neoplasie mammarie;
- soggetti diabetici;
- soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

6. REAZIONI AVVERSE

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

Estropill può essere utilizzato per:

Prevenire il calore:

La somministrazione deve iniziare appena si presentano i primi sintomi di calore (ingrossamento della vulva, perdite muco-emorragiche, etc.). La dose da impiegare è di 2 mg di principio attivo per kg di peso corporeo al giorno per 8 giorni consecutivi.

I segni dell'estro scompaiono nell'arco di 3-4 giorni. L'estro successivo compare entro un periodo variabile in relazione ai normali cicli del soggetto trattato.

Posporre il calore:

Tale sistema si consiglia quando si desidera che l'animale non entri in calore per un certo periodo di tempo in relazione a particolari eventi (mostre canine, periodi di caccia, viaggi molto lunghi, necessità di lasciare l'animale in custodia in un canile, etc.). In tali casi il dosaggio da impiegare è di 0,5 mg di principio attivo per kg di peso corporeo al giorno per

30 giorni consecutivi. Il periodo di assenza del calore inizia al 7° giorno di somministrazione e si prolunga per un periodo variabile che, comunque, è improbabile che superi i sei mesi. Tale sistema di somministrazione può essere effettuato anche routinariamente, ma non dovrebbe essere ripetuto più di una volta ogni sei mesi.

Trattare la falsa gravidanza:

La somministrazione deve iniziare non appena si notano i primi sintomi della falsa gravidanza. Il dosaggio è di 2 mg di principio attivo per kg di peso vivo per 10 giorni consecutivi. Dopo il 3° giorno si assiste a una regressione delle manifestazioni comportamentali e fisiche della falsa gravidanza. Si potrà fare ricorso al trattamento solo dopo una effettiva diagnosi differenziale, allo scopo di evitare trattamenti non corretti.

Peso del cane	Compresse da 20 mg di principio attivo al dì		Compresse da 5 mg di principio attivo al dì		Durata del trattamento (giorni)	
	Prevenzione del calore		Prevenz. calore	Posposiz. calore	Prev.ne	Posp.ne
2,5 kg	¼	oppure	1	¼	8	30
5 kg	½	“	2	½	“	“
7,5 kg	1	“	3	¾	“	“
10 kg	1	“	4	1	“	“
12,5 kg	1 ½	“	5	1 ¼	“	“
15 kg	1 ½	“	6	1 ½	“	“
17,5 kg	2	“	7	1 ¾	“	“
20 kg	2	“	8	2	“	“
22,5 kg	2 ½	“	9	2 ¼	“	“
25 kg	2 ½	“	10	2 ½	“	“
27,5 kg	3	“	11	2 ¾	“	“
30 kg	3	“	12	3	“	“
32,5 kg	3 ½	“	13	3 ¼	“	“
35 kg	3 ½	“	14	3 ½	“	“
37,5 kg	4	“	15	3 ¾	“	“
40 kg	4	“	16	4	“	“

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
 Proteggere dalla luce.
 Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
 Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:
 Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non pertinente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Gravidanza e allattamento:

Non usare durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Con l'uso prolungato del prodotto possono insorgere eventuali inconvenienti (vomito, inappetenza, metrorragie, falsa gravidanza, endometriti ghiandolari cistiche).

Incompatibilità principali:

Non pertinente.

13. PRECAUZIONI SPECIALI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Marzo 2022.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Estropill 20 è costituito da uno dei più potenti progestinici sintetizzati fino ad oggi, che è in grado di determinare il blocco dell'ovulazione e la scomparsa del calore nella cagna.

Tale sostanza, che è attiva per via orale e del tutto priva di tossicità, è stata a lungo sperimentata nella donna ed in numerose specie di animali senza aver mai dato luogo ad effetti collaterali indesiderabili.

La sua azione si realizza a livello delle ovaie impedendo la maturazione dell'ovulo ed evitando, quindi, la comparsa di tutte quelle manifestazioni fastidiose che accompagnano il calore della cagna.

Confezioni:

Astuccio contenente 1 blister da 8 compresse da 20 mg.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

6. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20 mg/ml sospensione iniettabile per cagne e gatte

7. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 ml contengono:

Principio attivo:

Megestrol acetato 2 g

Eccipienti:

Metile p-idrossibenzoato 0,130 g

Propile p-idrossibenzoato 0,015 g

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

8. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile.

Sospensione di colore da bianco a quasi bianco.

9. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cagne e Gatte.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Posposizione o prevenzione del calore nelle cagne e nelle gatte.

Cagne: il trattamento con Estropill iniettabile, se effettuato durante la fase anastrale (5 mesi e mezzo dall'ultimo calore), esplica una vera e propria azione preventiva (il calore ricomparirà a distanza di 6 mesi); se effettuato durante la fase proestrile (quando sono presenti i segni caratteristici dell'inturgescenza e delle perdite vulvari) permetterà comunque una posposizione del calore, che si ripresenterà 4-5 mesi dopo il trattamento.

Gatte: l'inoculazione di Estropill iniettabile all'inizio delle manifestazioni estrali permette di posporre il calore per un periodo di 4-5 mesi.

4.3 Controindicazioni

Il prodotto non deve essere impiegato:

- nei soggetti che presentano ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- nei soggetti sessualmente immaturi;
- nelle femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;

- nelle femmine affette da neoplasie mammarie;
- nei soggetti diabetici;
- nei soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Agitare prima dell'uso fino ad ottenere una sospensione omogenea.
Per la somministrazione del prodotto adottare le opportune precauzioni di asepsi.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza..

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.
Ogni eventuale reazione avversa grave o altra reazione non menzionata nell'SPC deve essere segnalata al veterinario prescrittore.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Il prodotto non va somministrato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

La somministrazione deve essere effettuata per via sottocutanea con un'unica inoculazione, rispettando i seguenti dosaggi:

CAGNE: 2 mg/kg p.v. pari a 0,1 ml di Estropill iniettabile ogni kg di p.v.

GATTE: 5 mg/kg p.v. pari a 0,25 ml di Estropill iniettabile ogni kg di p.v.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: Contraccettivi ormonali sistemici, Progestinici.
Codice ATCvet: QG03AC05

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Estropill iniettabile è una specialità medicinale a base di megestrolo acetato sotto forma di sospensione microcristallina.

Il megestrolo acetato è un potente progestinico di sintesi, universalmente utilizzato per la prevenzione e la posposizione del calore nelle cagne e nelle gatte.

Il meccanismo di azione di tale principio attivo consiste:

- nell'inibizione dell'ormone FSH (o follicolo-stimolante) con arresto della crescita dei follicoli ovarici e conseguente soppressione della produzione di estrogeni.
- nell'inibizione dell'ormone LH (o luteinizzante) con blocco dell'ovulazione e della formazione del corpo luteo.

Con una sola inoculazione di Estropill iniettabile si determinerà la scomparsa delle fastidiose modificazioni fisiologiche e comportamentali del calore e verrà assicurata un'efficace azione anticoncezionale.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Il megestrolo acetato somministrato per via sottocutanea viene rilasciato lentamente dal sito di inoculo: ciò determina la presenza, a livello plasmatico, di basse concentrazioni di farmaco che risultano, tuttavia, in grado di esplicare un'efficace attività farmacologica per un lungo periodo di tempo.

10. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Polietilenglicole 4000
Sodio cloruro
Polisorbato 80
Metile p-idrossibenzoato
Propile p-idrossibenzoato
Acqua p.p.i.

6.2 Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare nel proprio confezionamento per proteggere dalla luce.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone multidose in vetro tipo II, con tappo perforabile, contenente 5 ml di sospensione al 2% di megestrolo acetato (pari a 20 mg/ml).

10 flaconi multidose, in vetro tipo II, con tappo perforabile, contenenti 5 ml cad. di sospensione al 2% di megestrolo acetato (pari a 20 mg/ml).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Intervet Productions S.r.l., Via Nettunense km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 5 ml – A.I.C. n. 102063017

Scatola da 10 flaconi da 5 ml – A.I.C. n. 102063068

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 06 aprile 1985

Data dell'ultimo rinnovo: 01 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Ottobre 2018

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Scatola contenente 1 flacone da 5 ml

Scatola contenente 10 flaconi da 5 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20 mg/ml sospensione iniettabile per cagne e gatte.
Megestrol acetato

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

100 ml di prodotto contengono:

Principi attivi:

Megestrol acetato 2 g

Eccipienti:

Metile p-idrossibenzoato

Propile p-idrossibenzoato

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile

4. CONFEZIONI

Flacone da 5 ml

10 flaconi da 5 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cagne e Gatte.

6. INDICAZIONE(I)

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per via sottocutanea.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO(I) DI ATTESA

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD { mese/anno }

Dopo l'apertura, usare entro 28 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Conservare nel proprio confezionamento per proteggere dalla luce.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

14. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l. – Segrate (MI)

16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102063017

A.I.C. n. 102063068

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto { numero }



INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

Flacone da 5 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20 mg/ml sospensione iniettabile per cagne e gatte.
Megestrol acetato

2. QUANTITÀ DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

100 ml di prodotto contengono:
Megestrol acetato 2 g

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

5 ml

4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per via sottocutanea.

5. TEMPO(I) DI ATTESA

6. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

7. DATA DI SCADENZA

Scad. {mese/anno}
Dopo l'apertura, usare entro 28 giorni.

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

ESTROPILL 20 mg/ml sospensione iniettabile per cagne e gatte

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km 20.300 – 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l.

Strada di Olgia Vecchia snc

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova

20054 Segrate (MI)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 20 mg/ml sospensione iniettabile per cagne e gatte.

Megestrol acetato

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml contengono:

Principio attivo:

Megestrol acetato 2 g

Eccipienti:

Metile p-idrossibenzoato

Propile p-idrossibenzoato

4. INDICAZIONE(I)

Per la prevenzione o la posposizione del calore nelle cagne e nelle gatte.

Cagne: il trattamento con ESTROPILL iniettabile, se effettuato durante la fase anaestrale (5 mesi e mezzo dall'ultimo calore), esplica una vera e propria azione preventiva (il calore ricomparirà a distanza di 6 mesi); se effettuato durante la fase proestrale (quando sono presenti i segni caratteristici dell'inturgescenza e delle perdite vulvari) permetterà comunque una posposizione del calore, che si ripresenterà 4-5 mesi dopo il trattamento.

Gatte: l'inoculazione di ESTROPILL iniettabile all'inizio delle manifestazioni estrali permette di posporre il calore per un periodo di 4-5 mesi.

5. CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non deve essere impiegato:

- nei soggetti che presentano ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

- nei soggetti sessualmente immaturi;
- nelle femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- nelle femmine affette da neoplasie mammarie;
- nei soggetti diabetici;
- nei soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

6. REAZIONI AVVERSE

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cagne e Gatte.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione deve essere effettuata per via sottocutanea con un'unica inoculazione, rispettando i seguenti dosaggi:

Cagne: 2 mg/kg p.v. pari a 0,1 ml di ESTROPILL iniettabile ogni kg di p.v.

Gatte: 5 mg/kg p.v. pari a 0,25 ml di ESTROPILL iniettabile ogni kg di p.v.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

- Agitare prima dell'uso fino ad ottenere una sospensione omogenea.
- Per la somministrazione del prodotto adottare le opportune precauzioni di asepsi.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare nel proprio confezionamento per proteggere dalla luce
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Gravidanza e allattamento:

Il prodotto non va somministrato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivanti da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Ottobre 2018

15. ALTRE INFORMAZIONI

ESTROPILL iniettabile è una specialità medicinale a base di megestrolo acetato sotto forma di sospensione microcristallina.

Il megestrolo acetato è un potente progestinico di sintesi, universalmente utilizzato per la prevenzione e la posposizione del calore nelle cagne e nelle gatte.

Il meccanismo d'azione di tale principio attivo consiste:

- nell'inibizione dell'ormone FSH (o follicolo stimolante) con arresto della crescita dei follicoli ovarici e conseguente soppressione della produzione di estrogeni,
- nell'inibizione dell'ormone LH (o luteinizzante) con blocco dell'ovulazione e della formazione del corpo luteo.

Con una sola inoculazione di ESTROPILL iniettabile si determinerà la scomparsa delle fastidiose modificazioni fisiologiche e comportamentali del calore e verrà assicurata un'efficace azione anticoncezionale.

Confezioni:

Flacone da 5 ml.

Scatola da 10 flaconi da 5 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 ml contengono:

Principio attivo:

Megestrolo acetato 9,2 mg

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale limpida incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Gatte.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Prevenzione del calore nella gatta.

4.3 Controindicazioni

Il prodotto non deve essere impiegato:

- nei soggetti che presentano ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;
- nei soggetti sessualmente immaturi;
- nelle femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- nelle femmine affette da neoplasie mammarie;
- nei soggetti diabetici;
- nei soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Il prodotto non va somministrato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Estropill gocce si può mescolare ai normali cibi del gatto, purchè tiepidi, alla dose giornaliera di 5 gocce per ogni kg di peso vivo. La cura può essere prolungata al massimo per 365 giorni consecutivi, un secondo ciclo di cura può essere ripetuto trascorsi tanti giorni quanti sono stati quelli di trattamento.

Per via orale.

Le gocce possono essere somministrate come tali o mescolate ad un po' di cibo.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: Contraccettivi ormonali sistemici, Progestinici.
Codice ATCvet: QG03AC05

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Estropill gocce è costituito da uno dei più potenti e più recenti progestinici di sintesi, attivo, a piccolissime dosi, per via orale.

L'azione del principio attivo viene esercitata a livello delle ovaie impedendo la maturazione dell'ovulo e, quindi, la sua disponibilità per la fecondazione. Inoltre, inibendo la secrezione degli estrogeni naturali evita l'insorgenza di tutte quelle manifestazioni, così fastidiose, che accompagnano il calore della gatta.

Estropill gocce deve essere somministrato quotidianamente per mantenere l'animale in una fase di quiescenza sessuale (anestro). L'effetto inizia a partire dal 10° giorno e perdura per tutta la durata del trattamento ed oltre. La comparsa del calore ha luogo, dopo la sospensione della somministrazione, entro periodi variabili che sono anche in relazione alla durata globale della cura. Esperienze pratiche effettuate su numerosi soggetti hanno dimostrato che, con una cura di 365 giorni, il successivo calore può ricomparire nel periodo compreso tra l'80° ed il 140° giorno dalla sospensione della somministrazione di Estropill.

In caso di periodi di cura meno prolungati il calore compare entro lassi di tempo più brevi dopo la sospensione.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Il megestrolo acetato somministrato per via orale viene assorbito molto velocemente: ciò determina la necessità di doverlo somministrare quotidianamente per mantenere a livello plasmatico concentrazioni di farmaco che risultano in grado di esplicare un'efficace attività farmacologica.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Alcool etilico
Glicole propilenico.

6.2 Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 30 giorni se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Proteggere dalla luce.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Flaconi da 30 ml o da 100 ml di vetro tipo II e chiusi con contagocce di gomma butilica.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Intervet Productions S.r.l., Via Nettunense km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 30 ml – A.I.C. n. 102063031

Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102063056

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 giugno 1976

Data dell'ultimo rinnovo: 01 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DELTESTO

Ottobre 2018

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Flacone da 30 ml
Flacone da 100 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte
Megestrol acetato

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

100 ml contengono:

Principio attivo:
Megestrol acetato 9,2 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.

4. CONFEZIONI

Flacone da 30 ml
Flacone da 100 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatte.

6. INDICAZIONE(I)

Prevenzione del calore nella gatta.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO(I) DI ATTESA

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

Dopo l'apertura, usare entro 30 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l. – Segrate (MI)

16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102063031

A.I.C. n. 102063056

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto {numero}

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI
PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI**

Flacone da 30 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte
Megestrol acetato

2. QUANTITÀ DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Megestrol acetato 9,2 mg

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

30 ml

4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.

5. TEMPO(I) DI ATTESA

6. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

7. DATA DI SCADENZA

Scad. {mese/anno}
Dopo l'apertura, usare entro 30 giorni.

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

Flacone da 100 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte
Megestrolo acetato

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

100 ml contengono:

Principio attivo:

Megestrolo acetato 9,2 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.

4. CONFEZIONI

100 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatte.

6. INDICAZIONE(I)

Prevenzione del calore nella gatta.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO(I) DI ATTESA

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce.
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Dopo l'apertura, usare entro 30 giorni.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
Via Nettunense Km. 20,300 - 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:
MSD Animal Health S.r.l. – Segrate (MI)

16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102063056

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto {numero}

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km 20.300 – 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l.

Strada di Olgia Vecchia snc

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova

20054 Segrate (MI)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte.

Megestrol acetato.

3. INDICAZIONI DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml contengono:

Principio attivo:

Megestrol acetato 9,2 mg

Soluzione orale limpida incolore.

4. INDICAZIONE(I)

Prevenzione del calore nella gatta.

5. CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non deve essere impiegato:

- nei soggetti che presentano ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;
- nei soggetti sessualmente immaturi;
- nelle femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- nelle femmine affette da neoplasie mammarie;
- nei soggetti diabetici;
- nei soggetti che presentano manifestazioni di calore

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

6. REAZIONI AVVERSE

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandola cistica, piometra.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatte.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.

Estropill gocce si può mescolare ai normali cibi del gatto, purchè tiepidi, alla dose giornaliera di 5 gocce per ogni kg di peso vivo. La cura può essere prolungata al massimo per 365 giorni consecutivi, un secondo ciclo di cura può essere ripetuto trascorsi tanti giorni quanti sono stati quelli di trattamento.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le gocce possono essere somministrate come tali o mescolate ad un po' di cibo.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Proteggere dalla luce.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 30 giorni se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Gravidanza e allattamento:

Il prodotto non va somministrato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivanti da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Ottobre 2018.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Estropill gocce è costituito da uno dei più potenti e più recenti progestinici di sintesi, attivo, a piccolissime dosi, per via orale.

L'azione del principio attivo viene esercitata a livello delle ovaie impedendo la maturazione dell'ovulo e, quindi, la sua disponibilità per la fecondazione. Inoltre, inibendo la secrezione degli estrogeni naturali evita l'insorgenza di tutte quelle manifestazioni, così fastidiose, che accompagnano il calore della gatta.

Estropill gocce deve essere somministrato quotidianamente per mantenere l'animale in una fase di quiescenza sessuale (anestro). L'effetto inizia a partire dal 10° giorno e perdura per tutta la durata del trattamento ed oltre. La comparsa del calore ha luogo, dopo la sospensione della somministrazione, entro periodi variabili che sono anche in relazione alla durata globale della cura. Esperienze pratiche effettuate su numerosi soggetti hanno dimostrato che, con una cura di 365 giorni, il successivo calore può ricomparire nel periodo compreso tra l'80° ed il 140° giorno dalla sospensione della somministrazione di Estropill.

In caso di periodi di cura meno prolungati il calore compare entro lassi di tempo più brevi dopo la sospensione.

Confezioni:

Flacone contagocce da 30 ml

Flacone contagocce da 100 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.