

NOTICE

Anthelmin Plus Flavour comprimés pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots :

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Anthelmin Plus Flavour comprimés pour chiens
Praziquantel, embonate de pyrantel, fébantel

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Chaque comprimé contient :

Substances actives :

Praziquantel	50 mg
Embonate de pyrantel	144 mg
Fébantel	150 mg

Comprimés ronds, biconvexes, jaunes avec des taches plus foncées visibles, rayées avec une ligne en forme de croix d'un côté.

Les comprimés peuvent être divisés en deux ou quatre parties égales.

4. INDICATION(S)

Pour le traitement des infestations mixtes chez les chiens adultes et les chiots causées par les vers ronds et les vers plats des espèces suivantes :

Nématodes :

Ascarides: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formes immatures tardives et formes matures)

Ankylostomes : *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultes)

Cestodes :

Vers plats : *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la pipérazine.

Ne pas dépasser la dose prescrite en cas de traitement de chiennes gestantes.

Ne pas utiliser chez les animaux en cas d'hypersensibilité connue au principe actif, ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 2 kg.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas, des selles molles, diarrhées et/ou vomissements peuvent se manifester.

La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 au cours d'un traitement)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien (petite taille et moyenne taille).

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les doses recommandées sont : 15 mg de fébantel/kg de poids vif, 14,4 mg de pyrantel/ kg de poids vif et 5 mg de praziquantel/ kg de poids vif. Cela correspond à 1 comprimé par 10 kg de poids vif.

Les comprimés peuvent être divisés en deux /quatre parties égales pour permettre un dosage correct. Le(s) comprimé(s) peu(ven)t être administré(s) au chien soit directement, soit mélangé(s) à la nourriture. Aucune restriction alimentaire n'est requise avant ou après l'administration du médicament vétérinaire.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour s'assurer d'un dosage correct, il est nécessaire de déterminer le poids vif de l'animal le plus précisément possible.

Les chiots peuvent être vermifugés avec ce médicament vétérinaire dès qu'ils sont âgés de 2 semaines, et ce toutes les deux semaines jusqu'à l'âge de 12 semaines. Ensuite, ils doivent être traités à des intervalles de 3 mois jusque l'âge de 6 mois. Pour contrôler le *Toxocara*, les chiennes allaitantes doivent recevoir une dose 2 semaines après la mise bas, et la dose doit être répétée toutes les 2 semaines jusqu'au sevrage.

Pour les chiens adultes, les comprimés doivent être donnés lors d'une administration unique. L'avis d'un vétérinaire doit être pris concernant le besoin et la fréquence d'un traitement répété.

En cas de forte infestation par des vers ronds, répéter la dose 14 jours plus tard.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après EXP.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à chaque espèce cible :

Les puces sont l'hôte intermédiaire d'un type commun de ver plat, le *Dipylidium caninum*.

L'infestation par le ver plat est certaine de se reproduire à moins qu'un contrôle de la présence d'hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc. soit entrepris.

La résistance des parasites à une classe particulière d'anthelminthiques pourrait se développer suite à usage fréquent et répété d'un anthelminthique de cette classe.

Précautions particulières d'emploi chez l'animal :

Chaque comprimé partiellement utilisé doit être éliminé.

Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 2 kg.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Pour une bonne hygiène, les personnes qui administrent le comprimé directement à un chien ou le mélangent à la nourriture du chien, doivent se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte :

Consulter un vétérinaire avant d'appliquer un traitement contre les vers ronds à des femelles gravides.

Les comprimés peuvent être utilisés pendant la lactation.

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les premiers deux tiers de la période de gestation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions:

Ne pas administrer simultanément avec de la piperazine car les effets anthelminthiques du pyrantel et de la piperazine (présente dans plusieurs produits vermifuges pour chiens) peuvent avoir une action antagoniste.

L'utilisation concomitante avec d'autres composés cholinergiques peut induire une toxicité.

Surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes), si nécessaire:

Les benzimidazoles présentent une grande marge de sécurité. Le pyrantel n'est pas absorbé systématiquement à chaque mesure. Le praziquantel possède aussi une grande marge de sécurité jusqu'à cinq fois la dose recommandée.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts.

Jeter tout produit non utilisé et les conteneurs vides conformément aux directives des autorités locales concernant les déchets.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mai 2020

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 2 comprimés (1 plaquette thermoformée de 2 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 4 comprimés (2 plaquettes thermoformées de 2 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 10 comprimés (1 plaquette thermoformée de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 30 comprimés (3 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 50 comprimés (5 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 100 comprimés (10 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : 300 comprimés (30 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V392077

Sur délivrance libre