

B. PACKUNGSBEILAGE

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber

CEVA Santé Animale
Avenue de la Métrologie 6
1130 Bruxelles

Hersteller, der für die chargenfreigabe verantwortlich ist

Vetem S.p.A.
Lungomare Pirandello 8 - 92
014 Porto Empedocle (AG)
Italie

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VETRIMOXIN, 20mg, Paste

3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

15 ml Paste enthalten 300 mg Amoxicillin-Trihydrat.
Hilfsstoffe mit Fleischaroma.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bei Hund und Katze: zur Behandlung von Infektionen mit amoxicillin-empfindlichen Keimen, wie zum Beispiel:

- a. Infektionen des Atmungsorgane
- b. Infektionen des Magen-Darmtraktes
- c. Infektionen des Urogenitaltraktes
- d. Hautinfektionen

5. GEGENANZEIGE(N)

Nicht anwenden bei:

- a. Hunden und Katzen mit Penicillin-Allergie
- b. beim Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Gerbil: bei diesen Tierarten führen Aminopenicilline zu Enterotoxämien

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann es zu Verdauungsstörungen (Erbrechen, Dyspepsien) kommen, die stets gutartig und nur vorübergehend auftreten und in der Regel nicht das Absetzen der Behandlung erforderlich machen.

Es können allergische Reaktionen auftreten.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hund und Katze.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur oralen Anwendung.

10 mg Amoxicillin pro kg Körpergewicht, 2 Mal täglich über 5 Tage.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

-

10. WARTEZEIT

-

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Bei Raumtemperatur (15-25°C) und in der Originalverpackung aufbewahren.

Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums (EXP) nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung bei Tieren

Die Resistenzbildung bestimmter pathogener Mikroorganismen nimmt zu; die Anwendung des Produktes darf also nur bei empfindlichen Keimen erfolgen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Jeglichen Kontakt mit dem Produkt vermeiden, falls eine Überempfindlichkeit bekannt ist oder die Empfehlung ausgesprochen wurde, nicht mit Zubereitungen dieser Art zu arbeiten.

Zur Vermeidung jeglichen direkten Kontaktes das Produkt mit Vorsicht handhaben und alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut unverzüglich mit Wasser spülen.

Falls nach einem direkten Kontakt Symptome wie z.B. eine Hautrötung auftreten, einen Arzt aufsuchen und ihm diesen Abschnitt über die Vorsichtsmaßnahmen zeigen.

Das Auftreten eines Ödems im Bereich des Gesichtes, der Lippen oder der Augen sowie Atemschwierigkeiten stellen eine sehr schwerwiegende Komplikation dar und bedürfen schneller ärztlicher Hilfe.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Amoxicillin kann auch bei trächtigen Tieren angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Amoxicillin nicht in Verbindung mit bakteriostatisch wirkenden Antibiotika anwenden, da beide Stoffklassen antagonistisch wirken.

Überdosierung

Im Falle einer Überdosierung eine systematische Behandlung durchführen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Es müssen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um zu vermeiden, dass das Produkt in die Umwelt gelangt.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

18-10-2007

15. WEITERE ANGABEN

Schachtel mit 1 und 10 Dosierspritzen von 0 bis 15 ml.

BE-V159591