

**NOTICE POUR :****Anthelmin Plus XL comprimés pour chiens****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE**

Anthelmin Plus XL comprimés pour chiens  
Praziquantel, embonate de pyrantel, fébantel

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Chaque comprimé contient :

**Substances actives :**

Praziquantel	175 mg
Embonate de pyrantel	504 mg
Fébantel	525 mg

Comprimés ovales, biconvexes, à bords biseautés et présentant une ligne sur les deux faces. De couleur légèrement jaune verdâtre.

Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

**4. INDICATION(S)**

Pour le traitement des infestations mixtes chez les chiens adultes par les vers ronds et vers plats des espèces suivantes :

Nématodes :

Ascarides: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formes immatures tardives et formes matures)

Ankylostomes : *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultes)

Cestodes :

Vers plats : *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la pipérazine (présente dans plusieurs produits vermifuges pour chiens).

Ne pas utiliser chez les animaux en cas d'hypersensibilité connue au principe actif, ou

à l'un des excipients.

Ne pas dépasser la dose prescrite en cas de traitement de chiennes gestantes.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun connu.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien (grande et très grande taille).

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les doses recommandées sont: 15 mg de fébantel/kg de poids vif, 14,4 mg de pyrantel/kg de poids vif et 5 mg de praziquantel/kg de poids vif. Cela correspond à 1 comprimé par 35 kg de poids vif.

Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

Aucune restriction alimentaire n'est requise avant ou après l'administration du médicament vétérinaire.

Le(s) comprimé(s) peu(ven)t être administré(s) au chien soit directement, soit mélangé(s) à la nourriture.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour s'assurer d'un dosage correct, il est nécessaire de déterminer le poids vif de l'animal le plus précisément possible.

Pour contrôler le *Toxocara*, les chiennes allaitantes doivent recevoir une dose 2 semaines après la mise bas, et la dose doit être répétée toutes les 2 semaines jusqu'au sevrage.

En cas de forte infestation par des vers ronds, répéter la dose 14 jours plus tard.

Pour les chiens adultes, les comprimés doivent être donnés lors d'une administration unique. L'avis d'un vétérinaire doit être pris concernant le besoin et la fréquence d'un traitement répété.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après EXP.

## 12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

### Précautions particulières à chaque espèce cible :

Les puces sont l'hôte intermédiaire d'un type commun de ver plat, le *Dipylidium caninum*.

L'infestation par le ver plat est certaine de se reproduire à moins qu'un contrôle de la présence d'hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc. soit entrepris.

La résistance des parasites à une classe particulière d'anthelminthiques pourrait se développer suite à usage fréquent et répété d'un anthelminthique de cette classe.

### Précautions particulières d'emploi chez l'animal :

L'utilisation de ce médicament vétérinaire n'est pas recommandée chez les chiens de moins de 17,5 kg de poids vif.

Chaque comprimé partiellement utilisé doit être éliminé.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Pour une bonne hygiène, les personnes qui administrent le comprimé directement à un chien ou le mélangent à la nourriture du chien, doivent se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

### Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte :

Consulter un vétérinaire avant d'appliquer un traitement contre les vers ronds à des femelles gravides.

Le médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la lactation.

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les premiers deux tiers de la période de gestation.

### Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Ne pas administrer simultanément avec de la piperazine car les effets anthelmintiques du pyrantel et de la piperazine (présente dans plusieurs vermifuges produits pour chiens) peuvent avoir une action antagoniste.

L'utilisation concomitante avec d'autres composés cholinergiques peut induire une toxicité.

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRIAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts.

Jeter tout produit non utilisé et les contenants vides conformément aux directives des autorités locales concernant les déchets.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Février 2020

## 15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 2 comprimés (1 plaquette thermoformée de 2 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 4 comprimés (2 plaquettes thermoformées de 2 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 10 comprimés (1 plaquette thermoformée de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 12 comprimés (2 plaquettes thermoformées de 6 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 24 comprimés (4 plaquettes thermoformées de 6 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 30 comprimés (3 plaquettes thermoformées de 10 comprimés ou 5 plaquette thermoformées de 6 comprimés)

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 50 comprimés (5 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 60 comprimés (10 plaquettes thermoformées de 6 comprimés ou 6 plaquettes thermoformées de 10 comprimés)

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 100 comprimés (10 plaquettes thermoformées de 10 comprimés) dans une boîte.

Plaquette thermoformée d'OPA/Al/PVC-Al : boîte de 102 comprimés (17 plaquette thermoformées de 6 comprimés) dans une boîte.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V392086

Sur délivrance libre