

Wortlaut der für das Behältnis (Durchstechflasche mit Pulver) vorgesehenen Angaben

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Permacyl 236,3 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder
Penethamathydroiodid

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Jede Durchstechflasche enthält: 5 000 000 I.E. Penethamathydroiodid

oder

Jede Durchstechflasche enthält: 10 000 000 I.E. Penethamathydroiodid

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5 000 000 I.E. oder

10 000 000 I.E.

4. ART DER ANWENDUNG

Intramuskulär (i.m.)
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 2,5 Tage (60 Stunden)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Nach dem Öffnen sofort rekonstituieren. Nach der Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden (2-8 °C) verbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

Anlage C

Wortlaut der für das Behältnis (Durchstechflasche mit Lösungsmittel) vorgesehenen Angaben

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für
Permacyl 236,3 mg/ml

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

18 ml

oder

36 m

l

4. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

Anlage D

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Permacyl 236,3 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer
Injektionssuspension für Rinder
Penethamathydroiodid

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml der rekonstituierten Suspension enthält 250 000 I.E. (236,3 mg)
Penethamathydroiodid

.....
Durchstechflasche mit Pulver:
5 000 000 I.E. (4726 mg) Penethamathydroiodid

Durchstechflasche mit Lösungsmittel: 18 ml

oder

Durchstechflasche mit Pulver:
10 000 000 I.E. (9452 mg) Penethamathydroiodid

Durchstechflasche mit Lösungsmittel: 36 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x (5 000 000 IE Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml
Lösungsmittel)

oder

5 x (5 000 000 IE Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml
Lösungsmittel)

oder

10 x (5 000 000 IE Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml
Lösungsmittel)

oder

1 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 36 ml
Lösungsmittel)

oder

5 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 36 ml
Lösungsmittel)

oder

10 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver I und Durchstechflasche mit 36 ml Lösungsmittel)

5. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kühe während der Laktation)

6. ANWENDUNGSGEBIET

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskulär (i.m.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: 2,5 Tage (60 Stunden)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Penicilline und Cephalosporine können gelegentlich schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Siehe Packungsbeilage für Anwenderwarnungen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach dem Öffnen sofort rekonstituieren. Nach der Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden (2-8 °C) verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Die rekonstituierte Injektionssuspension für maximal 24 Stunden im Kühlschrank (2 - 8 °C) lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DIVASA-FARMAVIC, S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 Gurb-Vic (Barcelona)
Spain

Mitvertrieb:

(Deutschland)
Vetoquinol GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

(Österreich)
Vetoquinol Österreich GmbH
Gußhausstraße 14/5
1040 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER

DE: 402137.00.00

AT: Z.Nr.: 836400

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.