

**NOTICE**

**Felicam 1 mg comprimés à croquer pour chiens  
Felicam 2,5 mg comprimés à croquer pour chiens**

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE  
MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION  
RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Felix Pharmaceuticals Pvt. Ltd  
25-28 North Wall Quay  
Dublin 1, République d'Irlande

Fabricant responsable de la libération des lots :

Wasdell Europe Limited  
IDA Science and Technology Park, Mullaghlin  
Dundalk, Co. Louth, A91 DET0, Irlande

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Felicam 1 mg comprimés à croquer pour chiens  
Felicam 2,5 mg comprimés à croquer pour chiens  
Méloxicam

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Un comprimé contient :

Méloxicam 1 mg  
Méloxicam 2,5 mg

**1 mg** : Comprimé rond, biconvexe, tacheté, portant l'inscription « F et 6 » des deux côtés de la ligne de sécabilité sur une face et « M1 » sur l'autre face. Le comprimé peut être divisé en moitiés égales.

**2,5 mg** : Comprimé rond, biconvexe, tacheté, portant l'inscription « F et 6 » des deux côtés de la ligne de sécabilité sur une face et « M2 » sur l'autre face. Le comprimé peut être divisé en moitiés égales.

**4. INDICATION(S)**

Soulagement de l'inflammation et de la douleur associées aux troubles musculo-squelettiques aigus et chroniques chez les chiens.

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez les animaux gravides ou en lactation.

Ne pas utiliser chez les chiens souffrant de troubles gastro-intestinaux tels que des irritations et des hémorragies, d'une altération de la fonction hépatique, cardiaque ou rénale et de troubles hémorragiques.

Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 6 semaines d'âge ou ayant un poids corporel inférieur à 4 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables typiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que la perte d'appétit, les vomissements, la diarrhée, le sang occulte dans les selles, la léthargie et l'insuffisance rénale, ont été rapportés dans de très rares cas au cours de l'expérience post-commercialisation en matière de sécurité.

De très rares cas de diarrhée hémorragique, d'hématémèse, d'ulcération gastro-intestinale et d'élévation des enzymes hépatiques ont été rapportés au cours de l'expérience post-commercialisation en matière de sécurité.

Ces effets indésirables se produisent généralement au cours de la première semaine de traitement et sont dans la plupart des cas transitoires et disparaissent à la fin du traitement, mais dans de très rares cas, ils peuvent être graves ou mortels.

En cas d'effets indésirables, le traitement doit être interrompu et il faut demander l'avis d'un vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

Vous pouvez également le signaler par votre système national de pharmacovigilance :

[adversedrugreactions\\_vet@fagg-afmps.be](mailto:adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be)

## 7. ESPÈCES CIBLES

Chiens.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Le traitement initial consiste en une dose unique de 0,2 mg de méloxicam / kg de poids vif le premier jour, qui peut être administrée par voie orale ou alternativement en utilisant Meloxicam 5 mg/ml solution injectable pour chiens et chats.

Le traitement doit être poursuivi une fois par jour par administration orale (à des intervalles de 24 heures) à une dose de maintenant de 0,1 mg de méloxicam / kg de poids vif.

Chaque comprimé à croquer contient soit 1 mg ou 2,5 mg de méloxicam, ce qui correspond à la dose de maintenance quotidienne pour un chien de 10 kg ou un chien de 25 kg, respectivement.

Chaque comprimé à croquer peut être divisé en deux pour un dosage précis en fonction du poids corporel individuel du chien. Les comprimés à mâcher de méloxicam peuvent être administrés avec ou sans nourriture, sont aromatisés et sont pris volontairement par la plupart des chiens.

Schéma posologie pour la dose de maintenance :

Poids corporel (kg)	Nombre de comprimés à croquer		mg/kg
	1 mg	2,5 mg	
4,0 à 7,0	½		0,13 à 0,1
7,1 à 10,0	1		0,14 à 0,1
10,1 à 15,0	1 ½		0,15 à 0,1
15,1 à 20,0	2		0,13 à 0,1
20,1 à 25,0		1	0,12 à 0,1
25,1 à 35,0		1 ½	0,15 à 0,1
35,1 à 50,0		2	0,14 à 0,1

L'utilisation de Méloxicam suspension buvable pour chiens peut être envisagée pour un dosage encore plus précis. Pour les chiens pesant moins de 4 kg, l'utilisation de Méloxicam suspension buvable pour chien est recommandée.

Une réponse clinique est généralement observée dans les 3 à 4 jours. Le traitement doit être interrompu après 10 jours si aucune amélioration clinique n'est apparente.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Une attention particulière doit être portée à la précision du dosage. Veuillez suivre attentivement les instructions du vétérinaire.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP.

## 12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'emploi chez l'animal :

Éviter l'utilisation chez tout animal déshydraté, hypovolémique ou hypotendu, car il existe un risque potentiel de toxicité rénale.

Ce médicament vétérinaire pour chiens ne doit pas être utilisé chez les chats car son utilisation n'est pas convenable pour cette espèce. Chez les chats, Méloxicam 0,5 mg/ml suspension buvable pour chats doit être utilisée.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :  
Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux AINS doivent éviter d'entrer en contact avec le médicament vétérinaire.

En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et montrer la notice ou la boîte.

Gestation et lactation :

Voir rubrique « Contre-indications ».

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

D'autres AINS, des diurétiques, des anticoagulants, des antibiotiques aminosides et des substances à forte liaison protéique peuvent entrer en compétition pour la liaison et ainsi provoquer des effets toxiques. Le méloxicam ne doit pas être administré en concomitance avec d'autres AINS ou glucocorticostéroïdes.

Un prétraitement avec des substances anti-inflammatoires peut provoquer des effets indésirables supplémentaires ou accrus et, par conséquent, une période sans traitement avec de tels médicaments vétérinaires doit être observée pendant au moins 24 heures avant le commencement du traitement. Cependant, la période sans traitement doit prendre en compte les propriétés pharmacologiques des produits utilisés précédemment.

Surdosage (symptômes, procédures d'urgence, antidotes) :

En cas de surdosage, un traitement symptomatique doit être initié.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

Août 2023

**15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Tailles d'emballage :

Felicam 1 mg comprimés à croquer pour chiens : Plaquettes thermoformées de 7, 10, 84, 100, ou 252 comprimés.

Felicam 2,5 mg comprimés à croquer pour chiens : Plaquettes thermoformées de 7, 10, 84, 100, ou 252 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées

BE-V661674 (Felicam 1 mg)

BE-V661675 (Felicam 2,5 mg)

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire