

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton für eine 10 ml Durchstechflasche
Karton für eine 10 ml 20 ml Durchstechflasche
Karton für 5 x 10 ml Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VETERELIN 0,004 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)**Wirkstoff:**

Buserelin 0,004 mg/ml
(entspricht 0,0042 mg Buserelinacetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml
20 ml
5 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Pferd (Stute), Schwein (Sau und Jungsau) und Kaninchen (weiblich, zur Zucht).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind, Pferd und Kaninchen: Vorzugsweise intramuskuläre Anwendung, aber eine intravenöse oder subkutane Anwendung ist auch möglich.

Schwein: Vorzugsweise intramuskuläre Anwendung, aber eine intravenöse Anwendung ist auch möglich.

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. (MM/ JJJJ)

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um der Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V395577

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett für ein 10-ml- oder 20-ml-Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Veterelin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Buserelin..... 0,004 mg/ml
(entspricht 0,0042 mg Buserelinacetat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLSDATUM

Exp. {MM/ JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.