

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel mit einer Durchstechflasche mit 100 ml oder 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

MULTIMIN Injektionslösung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Zink: 60 mg (entsprechend Zinkoxid 74,68 mg)

Mangan: 10 mg (entsprechend Mangankarbonat 20,92 mg)


Kupfer: 15 mg (entsprechend Kupferkarbonat 26,09 mg)

Selen: 5 mg (entsprechend Natriumselenit 10,95 mg)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nur zur subkutanen Anwendung. Nicht intramuskulär anwenden.

Dosierung:

Rinder - bis zu 1 Jahr: 1 ml pro 50 kg

Rinder - zwischen 1-2 Jahren: 1 ml pro 75 kg

Rinder - über 2 Jahre: 1 ml pro 100 kg

Maximales Volumen pro Injektionsstelle: 7 ml.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verwenden. Verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Warburton Technology Limited

14. ZULASSUNGSNRUMMERN

Z.Nr.: 840566

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchstechflasche mit 100 ml und 500 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

MULTIMIN Injektionslösung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:


Zink: 60 mg (entsprechend Zinkoxid 74,68 mg)

Mangan: 10 mg (entsprechend Mangankarbonat 20,92 mg)

Kupfer: 15 mg (entsprechend Kupferkarbonat 26,09 mg)

Selen: 5 mg (entsprechend Natriumselenit 10,95 mg)

3. ZIELTIERART(EN)



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Nur zur subkutanen Anwendung. Nicht intramuskulär anwenden.

Dosierung:

Rinder - bis zu 1 Jahr: 1 ml pro 50 kg

Rinder - zwischen 1-2 Jahren: 1 ml pro 75 kg

Rinder - über 2 Jahre: 1 ml pro 100 kg

Maximales Volumen pro Injektionsstelle: 7 ml.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verwenden. Verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Warburton Technology Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}