

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FYPRYST 50 mg šķīdums pilināšanai kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 0,5 ml pipete satur:

Aktīvās vielas:

Fipronils 50 mg

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Butilhidroksianizols (E320)	0,1 mg
Butilhidroksitoluols (E321)	0,05 mg
Etilspirts (96%)	
Polisorbāts 80	
Povidons K25	
Dietilēnglikola monoetilēteris	

Gaiši dzeltens šķīdums.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Kaķi.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Blusu (*Ctenocephalides felis*) un ērcu (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) invāzijas ārstēšanai un novēršanai kaķiem.

Blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

Grauzējputi (*Felicola subrostratus*) invāzijas novēršanai un ārstēšanai kaķiem.

3.3. Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem ar ķermeņa svaru līdz 1 kg.

Nelietot šīs veterinārās zāles slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamas blakusparādības un pat nāve.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Lai mazinātu transmisīvo slimību risku, pirms šo veterināro zāļu lietošanas jānoņem uz dzīvniekiem esošās ērces.

Nav pieejami dati par vannas/mazgāšanas ar šampūnu ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem. Tomēr, pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu divas

dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, vannot kaķus nav ieteicams divas dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

Var novērot atsevišķu ērcu pieķeršanos. Tādējādi nelabvēlīgu apstākļu gadījumā nav iespējams pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesšanas risku no ērcēm. Ja ērces nav bijušas piesūkušās (sūkušas asinis), parasti tās ies bojā un no dzīvnieka nokrītīs 24 -48 stundu laikā pēc invāzijas. Pēc apstrādes nav iespējams izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanos.

Mājdzīvnieku blusas bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mēbelēs, kas lielas invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā apstrādājamās ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu. Izvairīties no šo veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu.

Izvairīties no šo veterināro zāļu saskares ar mutes gļotādu vai acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai spirtu jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Izvairīties no satura saskares ar pirkstiem. Ja saskare ir notikusi, nekavējoties mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi nejauša šo veterināro zāļu nokļūšana acīs, uzmanīgi skalot tās ar tīru ūdeni.

Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm, mazgāt rokas.

Apstrādātus dzīvniekus neglaudīt, līdz lietošanas vieta ir izzuvusi, un bērniem neļaut rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši pie bērniem.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, nesmēķēt, nedzert un neēst.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

3.6. Blakusparādības

Kaķi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Ādas zvīņošanās lietošanas vietā ¹ , apmatojuma izkrišana lietošanas vietā ¹ , nieze lietošanas vietā ¹ , apsārtums lietošanas vietā ¹ Vispārēja nieze, vispārēja apmatojuma izkrišana Pastiprināta siekalošanās ² , vemšana Neiroloģiskas pazīmes ³ , hiperestēzija ³ Nomāktība ³
--	--

¹Pārejoši.

²Var novērot arī, ja lietošanas vieta tiek laizīta (galvenokārt nesējvielas īpašību dēļ).

³Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam

pārstāvim, vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Šo veterināro zāļu drošums ir pierādīts vaislas, grūsnām un laktējošām kaķenēm, lietojot vairākas secīgas devas, kas līdz pat trijām reizēm pārsniedza ieteicamo devu. Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Auglība:

Drīkst lietot vaislas dzīvniekiem.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

3.9. Lietošanas veids un devas


Uzpilināšanai.

Deva:

Vienas 0,5 ml devas pipetes saturu, uzklāt uz ādas starp lāpstiņām.

Lietošanas metode:

1. Izņemt pipeti no iepakojuma. Turēt pipeti vertikāli ar vāciņu uz augšu, atskrūvēt un noņemt vāciņu.
2. Apgriezt vāciņu otrādi un uzlikt otru galu atpakaļ uz pipetes. Piespiest un pagriezt vāciņu, lai pārplēstu blīvējumu, un pēc tam noņemt vāciņu no pipetes.
3. Pašķirt apmatojumu uz ādas kakla pamatnē lāpstiņu priekšpusē, lai būtu redzama āda. Uzlikt pipetes galu uz ādas un vairākas reizes saspīest vienas devas pipeti, lai tās saturu iztukšotu tieši uz ādas vienā punktā.



Tā kā nav veikti pētījumi par šo veterināro zāļu drošumu, minimālais intervāls starp lietošanas reizēm ir 4 nedēļas.

Viena šo veterināro zāļu deva nodrošinās aizsardzību pret blusu invāziju līdz 5 nedēļām. Pret ērcēm šīs veterinārās zāles iedarbojas 2 nedēļas.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Laboratoriskajos pētījumos mērksugām par šo veterināro zāļu drošumu 8 nedēļas veciem un vecākiem kaķiem, kā arī kaķiem, kuri sver 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī, piecārtīgi pārsniedzot ieteicamo devu, sešus mēnešus pēc kārtas, blakusparādības netika novērotas.

Blakusparādību parādīšanās risks (skatīt 3.6. apakšpunktu) var palielināties, pārdozējot šīs veterinārās zāles.

Pēc ārstēšanas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā lietojot pārāk daudz šo veterināro zāļu, tas var izraisīt apmatojuma salipšanu lietošanas vietā. Ja tas notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc lietošanas.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QP53AX15.

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Fipronils ir fenilpirazolu grupas insekticīds/akaricīds. Tas iedarbojas uz posmkājiem, mijiedarbojoties ar hlorīda kanālu ligandiem, jo īpaši tiem, kurus regulē neiromediators gamma-aminosviestskābe (GASS), tādējādi bloķējot hlorīdjonu presinaptisko un postsinaptisko transportu caur šūnu membrānām. Rezultātā insektiem un ērcēm rodas nekontrolēta centrālās nervu sistēmas aktivitāte un tie iet bojā.

Šīs veterinārās zāles satur aktīvo vielu fipronilu, kam piemīt unikāls darbības mehānisms pret blusām un ērcēm. Šīs veterinārās zāles uzkrājas ādas un matu folikulu lipīdus saturošajās daļās un nepārtraukti izdalās no matu folikuliem uz ādas un apmatojumā, tādējādi nodrošinot ilgstošu iedarbību.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Kopējais fipronila daudzums, kas pēc šo veterināro zāļu lietošanas uzsūcas caur ādu pēc vietējas lietošanas, ir niecīgs.

Pēc šo veterināro zāļu lietošanas fipronils pēc koncentrācijas gradienta mehānisma uz dzīvnieku ādas un apmatojuma izplatās no lietošanas zonas uz perifērajām zonām (gurnu zonu, cirkšņiem u.c.).

Fipronils neuzsūcas un tādējādi netiek metabolizēts organismā.

Fipronila koncentrācija apmatojumā samazinās un divus mēnešus pēc lietošanas ir 1 µg/g.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav zināma.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Pipete (PP), vāciņš ar ķīli (PE vai POM): vienas devas pipete, kurā ir 0,5 ml šķīduma pilināšanai, trīsdaļīgā maisīnā (PETP/Al/ZBPE).

Iepakojuma lielumi:

Kastīte ar 1, 3, 6, 10, 20 pipetēm.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

KRKA, d.d., Novo mesto

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/DCP/10/0006

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 23/02/2010

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2025

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS
MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

KARTONA KASTĪTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FYPRYST 50 mg šķīdums pilināšanai

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra 0,5 ml pipete satur:

Fipronils 50 mg

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 x 0,5 ml
3 x 0,5 ml
6 x 0,5 ml
10 x 0,5 ml
20 x 0,5 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi.



5. INDIKĀCIJAS

Blusu, ērcu un grauzējutu invāzijas ārstēšanai un novēršanai kaķiem.



Ixodida




*Ctenocephalides
felis*



*Felicola
subrostratus*

6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.



7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

KRKA

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI

V/DCP/10/0006

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

MAISIŅŠ

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FYPRYST



2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

fipronil 50 mg


3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

KRKA



UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

PIPETE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FYPRYST



2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

50 mg

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

FYPRYST 50 mg šķīdums pilināšanai kaķiem

2. Sastāvs

Katra 0,5 ml pipete satur:

Aktīvās vielas:

Fipronils	50 mg
-----------	-------

Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320)	0,1 mg
Butilhidroksitoluols (E321)	0,05 mg

Gaiši dzeltens šķīdums.

3. Mērķsugas

Kaķi.



4. Lietošanas indikācijas

Blusu (*Ctenocephalides felis*) un ērcu (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) invāzijas ārstēšanai un novēršanai kaķiem.

Blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

Grauzējtu (*Felicola subrostratus*) invāzijas novēršanai un ārstēšanai kaķiem.

5. Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem ar ķermeņa svaru līdz 1 kg.

Nelietot šīs veterinārās zāles slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamās blakusparādības un pat nāve.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Lai mazinātu transmisīvo slimību risku, pirms šo veterināro zāļu lietošanas jānoņem uz dzīvniekiem esošās ērces.

Nav pieejami dati par vannas/mazgāšanas ar šampūnu ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem. Tomēr, pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu divas dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, vannot kaķus nav ieteicams divas dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

Var novērot atsevišķu ērcu pieķeršanos. Tādējādi nelabvēlīgu apstākļu gadījumā nav iespējams pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesšanas risku. Ja ērces nav bijušas piesūkušās (sūkušas asinis), parasti tās ies bojā un no dzīvnieka nokrītīs 24 -48 stundu laikā pēc invāzijas. Pēc apstrādes nav iespējams izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanos.

Mājdzīvnieku blusas bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mēbelēs, kas lielas invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā apstrādājamas ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Izvairīties no šo veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu.

Tādēļ jāizvairās no šo veterināro zāļu saskares ar mutes gļotādu vai acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai spirtu jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Izvairīties no satura saskares ar pirkstiem. Ja saskare ir notikusi, nekavējoties mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi šo veterināro zāļu nejauša nokļūšana acīs, uzmanīgi skalot tās ar tīru ūdeni.

Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm mazgāt rokas.

Apstrādātus dzīvniekus neglaudīt, līdz lietošanas vieta ir izžuvusi, un bērniem neļaut rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši pie bērniem.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, nesmēķēt, nedzert un neēst.

Grūsnība un laktācija:

Šo veterināro zāļu drošums ir pierādīts vaislas, grūsnām un laktējošām kaķenēm, lietojot vairākas secīgas devas, kas līdz pat trijām reizēm pārsniedza ieteicamo devu.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Auglība:

Drīkst lietot vaislas dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana:

Laboratoriskajos pētījumos mērksugām par šo veterināro zāļu drošumu 8 nedēļas veciem un vecākiem kaķiem, kā arī kaķiem, kuri sver 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī, pieckārtīgi pārsniedzot ieteicamo devu sešus mēnešus pēc kārtas, blakusparādības netika novērotas.

Blakusparādību parādīšanās risks var palielināties, pārdozējot šīs veterinārās zāles (skatīt punktu "Blakusparādības").

Pēc ārstēšanas var būt novērojama nieze.

Būtiska nesaderība:

Nav zināma.

7. Blakusparādības

Kaķi:

Ļoti reti	Ādas zvīņošanās lietošanas vietā ¹ , apmatojuma izkrišana lietošanas vietā ¹ , nieze lietošanas vietā ¹ , apsārtums lietošanas vietā ¹
-----------	--

(<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Vispārēja nieze, vispārēja apmatojuma izkrišana Pastiprināta siekalošanās ² , vemšana Neiroloģiskas pazīmes ³ , hiperestēzija ³ Nomāktība ³
---	--

¹Pārejoši.

²Var novērot arī, ja lietošanas vieta tiek laizīta (galvenokārt nesējvielas īpašību dēļ).

³Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontakttinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: www.pvd.gov.lv/lv.

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode


Uzpilināšanai.

Deva:

Vienas 0,5 ml devas pipetes saturu uzklāt uz ādas starp lāpstiņām.

Lietošanas metode:

1. Izņemt pipeti no iepakojuma. Turēt pipeti vertikāli ar vāciņu uz augšu, atskrūvēt un noņemt vāciņu.
2. Apgriezt vāciņu otrādi un uzlikt otru galu atpakaļ uz pipetes. Piespiest un pagriezt vāciņu, lai pārplēstu blīvējumu, un pēc tam noņemt vāciņu no pipetes.
3. Pašķirt apmatojumu uz ādas kakla pamatnē lāpstiņu priekšpusē, lai būtu redzama āda. Uzlikt pipetes galu uz ādas un vairākas reizes saspiest vienas devas pipeti, lai tās saturu iztukšotu tieši uz ādas vienā punktā.



Viena šo veterināro zāļu deva nodrošinās aizsardzību pret blusu invāziju līdz 5 nedēļām.

Pret ērcēm šīs veterinārās zāles iedarbojas 2 nedēļas.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Tā kā nav veikti pētījumi par šo veterināro zāļu drošumu, minimālais intervāls starp lietošanas reizēm ir 4 nedēļas.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā un uz kastītes pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/DCP/10/0006

Vienā apdrukātajā kastītē ir vienas devas pipetes ar 0,5 ml šķīduma, katra iepakota trīsdaļīgā maisiņā.

Iepakojuma lielumi:

Kastīte ar 1, 3, 6, 10, 20 pipetēm.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

11/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Tel.: +37125187879