

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

INSECTAL COLLAR

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Активни субстанции в нашийник:

Insectal collar 40 cm съдържа:

Fipronil 0,73 g

Pyriproxyfen 0,29 g

Insectal collar 65 cm съдържа:

Fipronil 1,29 g

Pyriproxyfen 0,52 g

Insectal collar 75 cm съдържа:

Fipronil 2,59 g

Pyriproxyfen 1,03 g

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лечебен нашийник.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

75 cm

65 cm

40 cm

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Контрол на инвазии със зрели и ларвни стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), смучещи въшки (*Linognathus setotus*), въшки (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодидни кърлежи (*Ixodidae*) при кучета и котки.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

След отваряне на опаковката разгънете нашийника със съответния размер и го поставете върху врата на животното, по такъв начин, че между шията на животното и нашийника да остане разстояние между 1,0 и 1,5 cm, след това фиксирайте закопчалката и отрежете излишната част от нашийника.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Р. България
Телефон: 0897 84 39 18
Електронна поща: info@verco.bg

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-3124

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Batch

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Индивидуални алуминиеви опаковки

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
INSECTAL COLLAR

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Активни субстанции в нашиятник:

Insectal collar 40 cm съдържа:

Fipronil 0,73 g

Pyriproxyfen 0,29 g

Insectal collar 65 cm съдържа:

Fipronil 1,29 g

Pyriproxyfen 0,52 g

Insectal collar 75 cm съдържа:

Fipronil 2,59 g

Pyriproxyfen 1,03 g

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

75 cm

65 cm

40 cm

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Batch

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

ЛИСТОВКА:

INSECTAL COLLAR
за кучета и котки

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Р. България
Телефон: 0897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

Производител:

JSC Scientific and Production Company "Ekoprom" 140070, 11/23 Garshina St., Tomilino, Lyubertsy, Moscow region, Russia
Телефон: +7 (495) 5149306
Email: ekoprom@ekoprom.org

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

INSECTAL COLLAR

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции в нашийник:

Insectal collar 40 cm съдържа:

Fipronil	0,73 g
Pyriproxyfen	0,29 g

Insectal collar 65 cm съдържа:

Fipronil	1,29 g
Pyriproxyfen	0,52 g

Insectal collar 75 cm съдържа:

Fipronil	2,59 g
Pyriproxyfen	1,03 g

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Контрол на инвазии със зрели и ларвни стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), смучещи въшки (*Linognathus setotus*), въшки (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодидни кърлежи (*Ixodidae*) при кучета и котки.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при отслабнали, болни и възстановяващи се животни.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не се наблюдават неблагоприятни реакции и усложнения след прилагане на INSECTAL COLLAR в съответствие с инструкциите за употреба. При свръхчувствителност към фипронил и/или пирипроксифен могат да се появят индивидуални реакции (прекомерно слюноотделяне, сълзене, признаци на кожно дразнене). В тези случаи отстранете нашийника, измийте животното със сапун и изплакнете козината с обилно количество течаща вода и, ако е необходимо, приложете антихистаминова и симптоматична терапия.


Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

След отваряне на опаковката разгънете нашийника със съответния размер и го поставете върху врата на животното, по такъв начин, че между шията на животното и нашийника да остане разстояние между 1,0 и 1,5 cm, след това фиксирайте закопчалката и отрежете излишната част от нашийника.



9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Постоянното носене на нашийника осигурява защита на кучетата и котките от насекоми за 5 месеца и от иксодови кърлежи за 4 месеца.

Поставете нашийника на животно 2-3 дни преди очакван контакт с паразити.

В случай на тежко опаразитяване, преди употреба на INSECTAL COLLAR измийте животното с инсектициден шампоан и обработете постелките с инсектицид в съответствие с инструкциите за употреба.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

В случай на кожни лезии отстранете нашийника, докато симптомите отшумят.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При работа с INSECTAL COLLAR, трябва да се спазват общите правила за лична хигиена и безопасност. След приключване на работата внимателно измийте ръцете си със сапун и топла вода.

Не позволявайте на животно с поставен нашийник да се доближава до малки деца.

Хора с установена свръхчувствителност към фипронил и/или пирипроксифен трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт на продукта с кожата или лигавиците на очите, измийте с обилно количество вода.

При случайно поглъщане или в случай на алергична реакция, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Не се прилага при кученца и котенца на възраст под 2 месеца.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не прилагайте INSECTAL COLLAR заедно с други инсектицидни и акарицидни продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
Няма симптоми на предозиране след прилагане на продукта.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

05/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР