

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ФОРТИКЛИНА РЕТАРД 200 mg/ml инжекционен разтвор
FORTICLINA RETARD 200 mg/ml solution for injection

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 1 ml от продукта се съдържа:

Активно вещество:

Охytetracycline (като dihydrate)200 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

20 ml, 50 ml, 100 ml и 250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда: Месо и вътрешни органи:30 дни.

Свине: Месо и вътрешни органи: 23 дни.

Овце и кози: Месо и вътрешни органи: 24 дни

Мляко: Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/ггг}

След отваряне използвайте в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

LABORATORIOS SYVA S.A.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1897

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Флакон от 50 ml, 100 ml и 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ФОРТИКЛИНА РЕТАРД 200 mg/ml инжекционен разтвор
FORTICLINA RETARD 200 mg/ml solution for injection

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 1 ml от продукта се съдържа:

Активно вещество:

Охytetracycline (като dihydrate)200 mg

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.
Преди употреба прочети листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:	Месо и вътрешни органи:30 дни.
Свине:	Месо и вътрешни органи: 23 дни.
Овце и кози:	Месо и вътрешни органи: 24 дни
Мляко:	Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвайте в рамките на. 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

LABORATORIOS SYVA S.A.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Флакон от 20 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ФОРТИКЛИНА РЕТАРД 200 mg/ml инжекционен разтвор
FORTICLINA RETARD 200 mg/ml solution for injection

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 1 ml от продукта се съдържа:

Активно вещество:

Охутetracycline (като dihydrate)200 mg

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвайте в рамките на 28 дни.

 Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV