

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Cypermethrinum	50 mg
Tetramethrinum	5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluén (E321) 3 mg

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Koncentrát na prípravu kožného roztoku.

Žltý až žltohnedý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľové druhy

Psy.

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Prevenca a likvidácia zvýšeného výskytu blch, kliešťov a vší, liečba demodikózy, sarkoptového a otodektového svrabu.

Postrek okolia proti muchám.

4.3 Kontraindikácie

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Nepoužívať u mačiek!

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Nepoužívať u mačiek. Liek je extrémne toxický pre mačky. Liek môže byť pre mačky nebezpečný i po kontakte s ošetreným psom.

Liek môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Len na vonkajšie použitie.

Liek je toxický pre ryby a včely.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Škodlivý pri kontakte s kožou, očami a sliznicami. Liek môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu lieku s očami a pokožkou. Zabráňte vdychovaniu výparov alebo postreku. Pyretroidy môžu spôsobiť pocit pálenia a svrbenia kože. Ľudia so známou precitlivosťou na pyretroidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým liekom.

Manipulácia s liekom:

Pri manipulácii s liekom nefajčiť, nejesť, nepiť. Po použití lieku si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Priamy kontakt lieku s pokožkou by mal byť obmedzený na minimum. Pri manipulácii s liekom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky: ochranný odev, ochranné okuliare a gumové alebo latexové rukavice.

Liek neaplikujte v blízkosti povrchových vôd. Vodu, ktorú použijete na očistenie kontaminovaného náradia, odstráňte podľa návodu, aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.

Zásady prvej pomoci a varovanie

Liek môže spôsobiť mierne až závažné podráždenie očí.

V prípade zasiahnutia očí, vyplachujte zasiahnuté oko prúdom vody aspoň po dobu 20 minút. Ak sa dostavia problémy, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo obal praktickému lekárovi.

Vyvaruje sa inhalácii a požitiu lieku. V prípade vdýchnutia lieku môže dôjsť poškodeniu pľúc. Po inhalácii lieku sa môže objaviť výtok z nosa alebo svrbenie hrdla. Ak sa dostavia problémy, presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Postihnutý by mal byť pod dohľadom. V prípade potreby vyhľadajte lekára.

V prípade potriesnenia pokožky umyte zasiahnutú časť tela mydlom, opláchnite väčším množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.

V prípade požitia malého množstva lieku alebo v prípade oneskorenej liečby, podajte postihnutému čierne uhlie alebo preháňadlo. Po požití nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo obal praktickému lekárovi.

4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Nie sú známe.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie

Liek sa môže bezpečne použiť v období gravidity.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Kožná aplikácia, postrek alebo kúpeľ.

Na umývanie, namáčanie a postrek povrchu tela psov treba použiť roztok lieku riedený v pomere 1:200. V prípade výskytu blch a vši je nutné aplikovať riedený liek na celý povrch tela a vystriekať búdu psa.

V záujme prevencie opakovaného výskytu blých treba ošetrovanie po 2 - 3 dňoch opakovať.

Kliešte sú zneškodnené v priebehu niekoľkých hodín.

Ošetrovanie proti sarkoptovému a otodektovému svrabu sa musí aplikovať v 10 - dennom intervale, kým nie sú dve následné vyšetrenia negatívne. Na liečbu otodektového svrabu treba roztok aplikovať na miesto lézie vo vonkajšom zvukovode. Ošetriť obe uši. Ušnice je vhodné ošetriť znovu po siedmich dňoch.

Postrek okolia:

Okolie zvierat postriekať roztokom lieku riedeným v pomere 1:400 (1 liter na 400 litrov vody) v 2 – 3 týždennom intervale. Jedno ošetrovanie výrazne obmedzí množstvo múch na 2 – 3 týždne.

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Liek môže spôsobiť mierne podráždenie očí alebo sliznice, ak sa nepoužije v súlade s návodom alebo dôjde k vdýchnutiu.

4.11 Ochranná (-é) lehota (-y)

Netýka sa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitikum na topické použitie, vrátane insekticídov; pyretríny a pyretroidy

ATCvet kód: QP53AC08

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Liek je zmes účinných látok, ktoré sa absorbujú cez kožu zvierat a účinne pôsobia proti ektoparazitom na zvieratách a v ich okolí a majú rýchly účinok proti lietajúcemu hmyzu. Vehikulum piperonyli butoxidum znásobuje účinnosť tetrametrínu a iných pyreteroidov znížením ich fotosensibility.

Liek okamžite zneškodňuje ektoparazity a poskytuje dlhodobú ochranu proti novému napadnutiu parazitmi. Doba tejto ochrany závisí do určitej miery od spôsobu liečby a situácie v chove zvierat.

Liek je širokospektrálne ektoparazitikum. Má vynikajúcu účinnosť proti muchám (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae* spp.), blchám (*Ctenocephalides* spp.), všiam (*Haemaphysalis*, *Damalinia*), svrabu (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), roztočom (*Demodicidae*) a kliešťom (*Ixodidae*).

Liek je účinný insekticíd:

- v rôznych podmienkach je vysoko účinný proti artropódam
- má široké ektoparazitické spektrum
- ľahko sa aplikuje

5.2 Farmakokinetické údaje

Rýchlo sa metabolizuje a vylučuje z obehu a tkanív.

Vplyv na životné prostredie

Liek je toxický pre ryby a včely. Nekontaminovať vodu liekom alebo použitými nádobami pred ich zneškodnením.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Piperonylbutoxid
Anhydrid kyseliny octovej
Butylhydroxytoluén (E 321)
Tekutý parafín
Geronol MS (emulgátor)
Geronol FF/4 (emulgátor)
Koncentrát aromatických uhlíkovodíkov

6.2 Závažné inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 3 roky.
Spotrebovať ihneď po namiešaní.

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C, na tmavom mieste, chrániť pred vlhkom.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

5 x 5 ml a 100 x 5 ml: ampulky z hnedého skla balené po 5 a 100 kusoch do kartónovej škatuli. Priložená písomná informácia pre používateľov.

1 l: plastová fľaša. Nalepená písomná informácia pre používateľov.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov ak sú potrebné

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Zabráňte kontaminácii vody liekom alebo použitými nádobami pred ich zneškodnením.

Odpad pochádzajúci z lieku alebo nadbytočný pracovný roztok nelikvidujte prostredníctvom verejnej kanalizácie. Zabráňte úniku lieku do vodných tokov, kanálov, odvodňovacích systémov, prameňov alebo jazier. Liek je vysoko toxický pre vodné organizmy, jeho vstup do vodných ekosystémov môže byť príčinou dlhotrvajúcich zmien v životnom prostredí.

Pracovný roztok by mal byť pred likvidáciou neutralizovaný hydrolýzou v alkalickom prostredí. Hydroxid sodný (5% lúh sodný) alebo nasýtený uhličitan sodný (7-10% sóda na pranie) môže byť použitý na bezpečnú degradáciu účinných látok.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/444/92-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25.7.1994

Dátum posledného predĺženia: 9.7.2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Netýka sa.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

{Papierová škatuľ'a}

5 x5 ml, 100 x 5 ml

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarží:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co., Ltd., Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

Cypermethrinum

Tetramethrinum

3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Cypermethrinum 50 mg

Tetramethrinum 5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluén (E321) 3 mg

Žltý až žltohnedý roztok.

4. INDIKÁCIE

Prevenca a likvidácia zvýšeného výskytu blch, kliešťov a vší, liečba demodikózy, sarkoptového a otodektového svrabu.

Postrek okolia proti muchám.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Nepoužívať u mačiek!

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

Ak zistíte akékoľvek vážne nežiaduce účinky, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Psy.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTY A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Kožná aplikácia, postrek alebo kúpeľ:

Na umývanie, namáčanie a postrek povrchu tela psov treba použiť roztok lieku riedený v pomere 1:200.

V prípade výskytu blch a vši je nutné aplikovať riedený liek na celý povrch tela a vystriekať búdu psa.

V záujme prevencie opakovaného výskytu blch treba ošetrovať po 2 - 3 dňoch opakovať.

Kliešte sú zneškodnené v priebehu niekoľkých hodín.

Ošetrovanie proti sarkoptovému a otodektovému svrabu sa musí aplikovať v 10 - dennom intervale, kým nie sú dve následné vyšetrenia negatívne. Na liečbu otodektového svrabu treba roztok aplikovať na miesto lézie vo vonkajšom zvukovode. Ošetriť obe uši. Ušnice je vhodné ošetriť znovu po siedmich dňoch.

Postrek okolia:

Okolie zvierat postriekať roztokom lieku riedeným v pomere 1:400 (1 liter na 400 litrov vody) v 2 – 3 týždennom intervale. Jedno ošetrovanie výrazne obmedzí množstvo múch na 2 – 3 týždne.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

-

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Netýka sa.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25 °C, na tmavom mieste, chrániť pred vlhkom.

Spotrebovať ihneď po namiešaní.

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSMONEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liek ihneď zneškodňuje ektoparazity a poskytuje dlhodobú ochranu proti novému napadnutiu parazitmi.

Doba tejto ochrany závisí do určitej miery od spôsobu liečby a situácii v chove zvierat.

Liek je širokospektrálne ektoparazitikum. Má vynikajúcu účinnosť proti muchám (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae* spp.), blchám (*Ctenocephalides* spp.), všiam (*Haemetopinus*, *Damalinia*), svrabu (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), roztočom (*Demodicidae*) a kliešťom (*Ixodidae*).

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 100 x 5 ml

Registračné číslo:

96/444/92-S

EXP:

(mesiac/rok)

Šarža:

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť

Ružinov, Slovenská republika

Tel.: 00421 2 55 56 64 88

Fax: 00421 2 55 56 64 87

e-mail: ceva@ceva-ah.sk

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

{Sklenená ampulka}

5 ml

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

2. ÚČINNÉ LÁTKY

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Cypermethrinum 50 mg

Tetramethrinum 5 mg

3. OBSAH V OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 ml

4. ČÍSLO ŠARŽE

<č. šarže> {číslo}

5. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

6. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

8. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIICEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov, Slovenská republika

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

5 x 5 ml, 100 x 5 ml

= označenie vnútorného obalu 1 l

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarží:

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

NEOSTOMOSAN koncentrát na prípravu kožného roztoku

Cypermethrinum

Tetramethrinum

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Cypermethrinum 50 mg

Tetramethrinum 5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluén (E321) 3 mg

Žltý až žltohnedý roztok.

4. INDIKÁCIE

Prevenia a likvidácia zvýšeného výskytu bĺch, kliešťov a vší, liečba demodikózy, sarkoptového a otodektového svrabu.

Postrek okolia proti muchám.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Nepoužívať u mačiek!

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

Ak zistíte akékoľvek vážne nežiaduce účinky, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Psy.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTY A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Kožná aplikácia, postrek alebo kúpeľ.

Na umývanie, namáčanie a postrek povrchu tela psov treba použiť roztok lieku riedený v pomere 1:200.

V prípade výskytu blch a vši je nutné aplikovať riedený liek na celý povrch tela a vystriekať búdu psa.

V záujme prevencie opakovaného výskytu blch treba ošetrovanie po 2 - 3 dňoch opakovať.

Kliešte sú zneškodnené v priebehu niekoľkých hodín.

Ošetrovanie proti sarkoptovému a otodektovému svrabu sa musí aplikovať v 10 - dennom intervale, kým nie sú dve následné vyšetrenia negatívne. Na liečbu otodektového svrabu treba roztok aplikovať na miesto lézie vo vonkajšom zvukovode. Ošetriť obe uši. Ušnice je vhodné ošetriť znovu po siedmich dňoch.

Postrek okolia:

Okolie zvierat postriekať roztokom lieku riedeným v pomere 1:400 (1 liter na 400 litrov vody) v 2 – 3 týždennom intervale. Jedno ošetrovanie výrazne obmedzí množstvo múch na 2 – 3 týždne.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

-

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Netýka sa.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C, na tmavom mieste, chrániť pred vlhkom.

Spotrebovať ihneď po namiešaní.

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Nepoužívať u mačiek. Liek je extrémne toxický pre mačky. Liek môže byť pre mačky nebezpečný i po kontakte s ošetrovaným psom.

Liek môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Len na vonkajšie použitie.

Liek je toxický pre ryby a včely.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Škodlivý pri kontakte s kožou, očami a sliznicami. Liek môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.

Zabráňte kontaktu lieku s očami a pokožkou. Zabráňte vdychovaniu výparov alebo postreku.

Pyretroidy môžu spôsobiť pocit pálenia a svrbenia kože. Ľudia so známou precitlivosťou na pyretroidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým liekom.

Manipulácia s liekom:

Pri manipulácii s liekom nefajčiť, nejst', nepiť.

Po použití lieku si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

Priamy kontakt lieku s pokožkou by mal byť obmedzený na minimum. Pri manipulácii s liekom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky: ochranný odev, ochranné okuliare a gumové alebo latexové rukavice.

Liek neaplikujte v blízkosti povrchových vôd.

Vodu, ktorú použijete na očistenie kontaminovaného náradia, odstráňte podľa návodu, aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.

Zásady prvej pomoci a varovanie:

Liek môže spôsobiť mierne až závažné podráždenie očí.

V prípade zasiahnutia očí, vyplachujte zasiahnuté oko prúdom vody aspoň po dobu 20 minút. Ak sa dostavia problémy, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo obal praktickému lekárovi.

Vyvaruje sa inhalácii a požitiu lieku. V prípade vdýchnutia lieku môže dôjsť poškodeniu pľúc. Po inhalácii lieku sa môže objaviť výtok z nosa alebo svrbenie hrdla. Ak sa dostavia problémy, presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Postihnutý by mal byť pod dohľadom. V prípade potreby vyhľadajte lekára.

V prípade potriesnenia pokožky umyte zasiahnutú časť tela mydlom, opláchnite väčším množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.

V prípade požitia malého množstva lieku alebo v prípade oneskorenej liečby, podajte postihnutému čierne uhlie alebo preháňadlo. Po požití nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo obal praktickému lekárovi.

Použitie počas gravidity, laktácie:

Liek sa môže bezpečne použiť v období gravidity.

Predávkovanie:

Liek môže spôsobiť mierne podráždenie očí alebo sliznice, ak sa nepoužije v súlade s návodom alebo dôjde k vdýchnutiu.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Zabráňte kontaminácii vody liekom alebo použitými nádobami pred ich zneškodnením.

Odpad pochádzajúci z lieku alebo nadbytočný pracovný roztok nelikvidujte prostredníctvom verejnej kanalizácie. Zabráňte úniku lieku do vodných tokov, kanálov, odvodňovacích systémov, prameňov alebo jazier. Liek je vysoko toxický pre vodné organizmy, jeho vstup do vodných ekosystémov môže byť príčinou dlhotrvajúcich zmien v životnom prostredí.

Pracovný roztok by mal byť pred likvidáciou neutralizovaný hydrolýzou v alkalickom prostredí. Hydroxid sodný (5% lúh sodný) alebo nasýtený uhličitan sodný (7-10% sóda na pranie) môže byť použitý na bezpečnú degradáciu účinných látok.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSUMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liek okamžite zneškodňuje ektoparazity a poskytuje dlhodobú ochranu proti novému napadnutiu parazitmi. Doba tejto ochrany závisí do určitej miery od spôsobu liečby a situácie v chove zvierat.

Liek je širokospektrálne ektoparazitikum. Má vynikajúcu účinnosť proti *muchám* (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae* spp.), *blchám* (*Ctenocephalides*

spp.), všiam (*Haemetopinus*, *Damalinia*), svrabu (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), roztočom (*Demodicidae*) a kliešťom (*Ixodidae*).

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 5 x 5 ml, 100 x 5 ml, 1 l

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

+

pre 1 l balenie:

Registračné číslo:

96/444/92-S

EXP:

(mesiac/rok)

Šarža:

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov, Slovenská republika

Tel.: 00421 2 55 56 64 88

Fax: 00421 2 55 56 64 87

e-mail: ceva@ceva-ah.sk

