

## BIPACKSEDEL

### Ruvax vet. injektionsvätska, suspension

- NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Strødamvej 52  
2100 Köpenhamn Ø  
Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
Laboratoire Porte des Alpes  
Rue de l'Aviation  
69800 Saint Priest  
Frankrike

- DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Ruvax vet. injektionsvätska, suspension

- DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

2 ml (1 dos) innehåller:

*Aktivt innehållsämne:*

Lyserade bakterieceller av rödsjuka (*Erysipelothrix rhusiopathiae*) serotyp 2,  $\geq 1$  ELISA enheter

*Övriga innehållsämnen:*

Aluminiumhydroxid (uttryckt som Al<sup>+++</sup>) 4,2 mg

Tiomersal  $\leq 0,2$  mg

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

- ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Aktiv immunisering av svin mot rödsjuka.

- KONTRAINDIKATIONER**

Inga.

- BIVERKNINGAR**

Lokal, övergående svullnad på injektionsstället kan förekomma. Vaccinet kan utlösa överkänslighetsreaktioner hos vissa djur.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
www.lakemedelsverket.se

## **7. DJURSLAG**

Svin.

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Vaccinet omskakas före injektion. Använd normal aseptisk hantering. Endast friska djur bör vaccineras.

2 ml (1 dos) ges djupt intramuskulärt i nacken bakom örat. (Subkutan injektion är möjlig)

Vaccinationsprogram:

*Grundvaccinering (från 10 veckors ålder):* 2 injektioner med 3-4 veckors mellanrum. Den andra injektionen måste ges minst tre veckor före eventuell betäckning.

*Revaccinering:* Var 6:e månad (sugor återvaccineras lämpligen i den sista dräktighetsmånaden, gyltor senast tre veckor innan betäckning).

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

## **10. KARENSTID**

Noll dygn.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 dygn

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP.

## **12. SÄRSKILDA VARNINGAR**

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet:

Vaccinering kan ske under dräktighet.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Vid dubbel dos har inte symtom på överdosering observerats.

## **13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med

mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2020-06-25

**15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**