

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma-und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 241 06 Kiel, SRN

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Drontal tablety

Pyranteli embonas

Praziquantelum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje: Pyranteli embonas 230 mg, Praziquantelum 20 mg

4. INDIKACE

Přípravek proti nematodózám a cestodózám koček a koťat.

Odčervení koček a koťat vyvolaných plochými a oblémi červy:

Škrkavky: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*. Měchovci: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma brasiliense*. Tasemnice: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat během březosti a u koťat mladších 3 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 tableta na 4 kg ž.hm., jednorázové perorální podání.

Přímo perorálně, v krmivu nebo rozdrcené v potravě. Tablety se podávají přímo zvířeti, nejlépe schované v kousku masa, uzeniny nebo rozmačkané do krmiva. Hladovka nebo dietetická opatření nejsou potřebná.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Praziquantel v kombinaci s pyrantelem je účinný proti většině důležitých tasemnic u koček. Praziquantel působí proti všem stádiím těchto parazitů vyvíjejících se ve střevech koček. Pyrantel působí proti škrkavkám. Bez konzultace s vet. lékařem je možno použít přípravek u zdravých zvířat. V případě zvířat nemocných nebo oslabených kontaktujte vašeho veterinárního lékaře. Ve vztahu k možné reinfekci tasemnicí *Dipylidium caninum* je nutné odběšení zvířete.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při předávkování lze počítat se zvracením jako prvním symptomem.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2024

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.