

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{ Faltkarton }

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Alamycin 300 LA - Injektionslösung für Tiere

### 2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält 300 mg Oxytetracyclin (entsprechend 323,50 mg Oxytetracyclin-Dihydrat)

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Standard-Dosierung:

1 ml/15 kg KGW (20 mg/kg KGW).

Wenn nötig eine weitere Injektion frühestens nach 3-4 Tagen.

Hohe Dosierung:

1 ml/10 kg KGW (30 mg/kg KGW).

Wenn nötig eine weitere Injektion frühestens nach 5-6 Tagen.

Zur tiefen intramuskulären Injektion.

Schweine: Die intramuskuläre Injektion erfolgt vorzugsweise in die seitliche Halsmuskulatur hinter dem Ohr. Der Kanüldurchmesser soll 1,2 mm nicht überschreiten.

Volumina über 7 ml sind auf mehrere Injektionsstellen aufzuteilen.

Maximales Injektionsvolumen beim Ferkel: 0,2 bis 1 ml

Rinder: Vorzugsweise in den Bereich der Oberarmmuskulatur (M. anconeus) bzw. der Glutealmuskulatur. Volumina über 10 ml sind auf mehrere Injektionsstellen aufzuteilen.

### 7. WARTEZEITEN

Bei einer Dosierung von 1 ml/15 kg KGW (20 mg/kg KGW):

Rind:

Essbares Gewebe: 28 Tage.

Milch: 10 Tage.

Schwein:

Essbares Gewebe: 14 Tage.

Bei einer Dosierung von 1 ml/10 kg KGW (30 mg/kg KGW):

Rind:

Essbares Gewebe: 35 Tage.

Milch: 10 Tage.

Schwein:

Essbares Gewebe: 28 Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Trocken lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Vertrieb in Österreich:

PRO ZOON Pharma GmbH Karl-Schönherr-Straße 3

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 8-00479

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**

{ Etikett }

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Alamycin 300 LA - Injektionslösung für Tiere

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ein ml enthält 300 mg Oxytetracyclin (entsprechend 323,50 mg Oxytetracyclin-Dihydrat)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur tiefen intramuskulären Injektion.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Bei Dosierung von 1 ml/15 kg KGW (20 mg/kg KGW):

Rind: Essbares Gewebe: 28 Tage, Milch: 10 Tage.

Schwein: Essbares Gewebe: 14 Tage.

Bei Dosierung von 1 ml/10 kg KGW (30 mg/kg KGW):

Rind: Essbares Gewebe: 35 Tage, Milch: 10 Tage.

Schwein: Essbares Gewebe: 28 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Erste Entnahme am \_\_\_\_\_.

Nach erstmaligem Öffnen im Kühlschrank (2°C bis 8°C) aufbewahren. Der Inhalt darf nur innerhalb von 3 Tagen nach der ersten Entnahme verwendet werden.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Trocken lagern. Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}