

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-1813**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

ИХТИОЛ 10% спрей  
ICHTHYOL 10% spray  
Спрей за кожа за коне и кучета.

**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

В 100 ml се съдържат:

**Активно вещество:**

Ichthammol 10.0 g

**Помощни вещества:**

Качествен състав на помощните вещества и другите съставки
Sorbitan stearate
Polysorbate 20
Purified water
Ethanol 70%

**3. КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**3.1 Видове животни, за които е предназначен ВЛП**

Коня и кучета.

**3.2 Показания за употреба за всеки вид животни, за който е предназначен продуктът**

За лечение на екземи, гнойни дерматити, абцеси, гнойни рани, фурункули, фистули, язви, изгаряния и измръзвания.

**3.3 Противопоказания**

Няма.

**3.4 Специални предупреждения**

Необходимо е преди третирането с ветеринарния лекарствен продукт, некротичните и гнойните участъци на раната да се почистят.

**3.5 Специални предпазни мерки при употреба**

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се спазват условията за асептика и да се избягва пряк контакт с кожата. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния

лекарствен продукт. Хора с установена свръхчувствителност към ichthammol трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

#### Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Не е приложимо.

### **3.6 Неблагоприятни реакции**

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия, или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване. За съответните данни за връзка вижте също точка 16 от листовката.

### **3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене**

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

### **3.8 Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**

Не са известни.

### **3.9 Начин на приложение и дозировка**

За прилагане върху кожата.

Некротичните и гнойните участъци на раната трябва предварително се почистят и да се застригват. Ихтиол 10% спрей се впръсква в продължение на 1-2 секунди от разстояние 15-20 cm двукратно - сутрин и вечер в продължение на 4-5 дни.

### **3.10 Симптоми на предозиране (и когато е приложимо — процедури на действие при спешни случаи и антидоти)**

При многократно предозиране не са наблюдавани неблагоприятни реакции при видовете животни, за които е предназначен ветеринарният лекарствен продукт.

### **3.11 Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба, включително ограничения за употребата на антимикробни и противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти, с цел да се ограничи рискът от развитие на резистентност**

Не е приложимо.

### **3.12 Карентни срокове**

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

## **4. ФАРМАКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **4.1 Ветеринарен лекарствен анатомо-терапевтичен код (ATCvet Code): QD08AX**

Други антисептици и дезинфектанти.

Ихтиолът с подходящи помощни вещества действа изключително благоприятно при лечение на екземи, гнойни дерматити, абцеси, гнойни рани, фурункули, фистули, язви, изгаряния и измръзвания. Ефикасен е срещу Грам-положителните микроорганизми. Стеснява кръвоносните съдове, намалява болковите усещания и секрецията и оказва противовъзпалителен ефект. Понижава усещането за сърбеж. Ускорява зарастването на раните, усилва фагоцитозата и действа кератопластично.

## **5. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

### **5.1 Основни несъвместимости**

Не са известни.

### **5.2 Срок на годност**

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

### **5.3 Специални условия за съхранение**

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

### **5.4 Вид и състав на първичната опаковка**

Пластмасов флакон с механична помпа с дюза и предпазна капачка от 100 ml и 200 ml.

### **5.5 Специални мерки за унищожаване на неизползвани продукти или остатъци от тях**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

## **6. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

“Фарма Вет” ООД

## **7. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

№ 0022-1813

## **8. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 13/07/2012

## **9. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

02/2024

## **10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*