

B. PACKUNGSBEILAGE

**KENNZEICHNUNG
AVICAS®**

- 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**
Registrierungsinhaber: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze.
Hersteller: Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem
- 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**
Avicas®
- 3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**
EinenTablette enthält: Febantel 15 mg - Cellulos microcristall. - Sod. Starch Glycoll. - Polysorb. - Polyvidon. - Silic. colloid. anhydr. - Magn. stear. - Lactose q.s. ad 105 mg.
- 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**
Behandlung von Wurminfektionen bei Tauben von Ascaridia columbae (Spulwurm) und Capillaria spp. (Haarwurm).
- 5. GEGENANZEIGEN**
Nicht behandeln während der Mauser und nicht anwenden bei Tauben, die ihre Jungen füttern.
Nur zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- 6. NEBENWIRKUNGEN**
Keine Nebenwirkungen bei therapeutischer Dosierung.
- 7. ZIELTIERART(EN)**
Tauben, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**
Dosierung: 30 mg/kg. Das stimmt überein mit 1 Tablette pro Taube unmittelbar in den Schnabel. 8 Tage später nochmals wiederholen.
Bei schwerem Capillaria Befall: 2 aufeinanderfolgende Tage behandeln und 1 Woche später nochmals 2 Tage.
- 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**
Orale Verabreichung. 1 Tablette pro Taube unmittelbar in den Schnabel.
- 10. WARTEZEIT**
Nur zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Der Verzehr von Tauben behandelt mit Avicas kann Probleme für die Gesundheit des Konzumenten verursachen.
- 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**
Bei Zimmertemperatur lagern (15 - 25°C).
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- 12. BESONDERE WARNHINWEISE**
Bei Infektion alle Tauben im Schlag zusammen behandeln. Nach der Behandlung den Schlag gut säubern, um Reinfektion zu vermeiden.
Zum heute is keinen nachteiligen Einfluß von Febantel auf die Fortpflanzung festgelegt.
Eine häufige und wiederholte Anwendung kann zu einer Resistenz führen.

Der Verzehr von Tauben behandelt mit Avicas kann Probleme für die Gesundheit des Konzumenten verursachen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Man soll die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nehmen, so daß nicht-angewendete-Produkten nicht in die Umwelt hinkommen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

02/2012

15. WEITERE ANGABEN

Tierärztliche Verwendung
Rezeptfreie Abgabe

BE-V168323