

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

REVERTOR 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml injekcinio tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

atipamezolio hidrochlorido 5 mg, atitinkančio 4,27 mg atipamezolio;

pagalbinių medžiagų:

metilparahidroksibenzoato (E 218) 1 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Atipamezolio hidrochloridas yra selektyvus α_2 -antagonistas, skirtas šunims ir katėms sedatyviniam medetomidino ar deksmedetomidino poveikiui panaikinti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti veisiamiems šunims ir katėms bei gyvūnams, sergantiems kepenų ar inkstų ligomis. Taip pat žr. 4.7 p.

4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Panaudojus preparatą, gyvūną reikia palikti ramioje aplinkoje. Atsibudimo metu gyvūnų negalima palikti be priežiūros. Prieš siūlant gyvūnui ėsti ar gerti, būtina įsitikinti, ar gyvūnas jau gali normaliai ryti.

Dėl skirtingų rekomenduotinių dozių preparatą būtina apdairiai naudoti ne pagal nurodymus ne paskirties rūšių gyvūnams.

Jei kartu su medetomidinu naudojami ir kiti raminamieji, reikia turėti omenyje, kad pastarųjų poveikis gali išlikti panaikinus medetomidino (deksmedetomidino) poveikį.

Atipamezolis nepanaikina ketamino poveikio, kuris gali sukelti šunims traukulius ir katėms mėšlungį. Naudojus ketaminą, atipamezolį galima naudoti tik praėjus 30–40 min.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atipamezolis stipriai veikia farmakologiškai, dėl to būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis, o atsitiktinai patekus reikia nedelsiant plauti švariu tekančiu vandeniu. Jei dirginimas išlieka, reikia kreiptis į gydytoją. Reikia nusivilkėti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda.

Vaistą reikia naudoti apdairiai ir stengtis atsitiktinai neiššvirkšti ar nepraryti. Atsitiktinai įsišvirkštus ar prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Per pirmąsias 10 min. sušvirkštus atipamezolio hidrochlorido gali trumpam sumažėti kraujospūdis. Retai gali padidėti aktyvumas, pasireikšti tachikardija, seilėjimasis, netipiškas lojimas, raumenų drebulys, vėmimas, padažnėjęs kvėpavimas, išmatų ir šlapimo nelaikymas. Labai retais atvejais gali pasireikšti pakartotinas raminamųjų poveikis arba nesutrumpėti pabudimo laikas panaudojus atipamezolį.

Katėms, naudojant nedidelėmis dozėmis medetomidino arba deksmedetomidino poveikio daliniam panaikinimui, galima hipotermija (net jei kilo dėl sedacijos).

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu, nes atipamezolio saugumas vaikingumui ir laktacijai nėra tinkamai ištirtas.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nerekomenduotina naudoti atipamezolį kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistais, pvz. diazepamu, acepromazinu ar opiatais.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti į raumenis vieną kartą.

Vaistą reikia švirkšti praėjus 15–60 min. po medetomidino hidrochlorido ar deksmedetomidino hidrochlorido švirkštimo.

Šunims atipamezolio hidrochlorido dozė į raumenis mikrogramais yra 5 kartus didesnė nei medetomidino hidrochlorido ar 10 kartų didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido. Šiame vaiste yra 5 kartus didesnė veikliosios medžiagos (atipamezolio hidrochlorido) koncentracija, lyginant su preparatais, kurių 1 ml yra 1 mg medetomidino hidrochlorido, ir 10 kartų didesnė koncentracija, lyginant su preparatais, turinčiais 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, todėl preparatus reikia skirti lygiomis dalimis.

Dozavimo pavyzdys šunims:

Medetomidino 1 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo šunims dozavimas
0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 40 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio
Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo šunims dozavimas
0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 20 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio

Katėms atipamezolio hidrochlorido dozė į raumenis mikrogramais yra 2,5 karto didesnė nei medetomidino hidrochlorido ar 5 kartus didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido. Šiame vaiste yra 5 kartus didesnė veikliosios medžiagos (atipamezolio hidrochlorido) koncentracija, lyginant su

preparatais, kurių 1 ml yra 1 mg medetomidino hidrochlorido, ir 10 kartų didesnė koncentracija, lyginant su preparatais, turinčiais 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, todėl preparato reikia skirti perpus mažiau nei medetomidino ar deksmedetomidino.

Dozavimo pavyzdys katėms:

Medetomidino 1 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo katėms dozavimas
0,08 ml/kg kūno svorio, t. y., 80 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio
Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo katėms dozavimas
0,08 ml/kg kūno svorio, t. y., 40 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio

Atsibudimo laikas sutrumpėja iki maždaug 5 min. Panaudojus preparatą, gyvūnas tampa judrus po maždaug 10 min.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Atipamezolio hidrochlorido perdozavimas gali sukelti trumpalaikę trachikardiją ir padidėjusį judrumą (hiperaktyvumą, raumenų drebulį). Jei būtina, šiuos simptomus galima panaikinti skiriant medetomidino (deksmedetomidino) hidrochlorido dozę, kuri turi būti mažesnė nei paprastai naudojama klinikinė dozė.

Jei atipamezolio hidrochloridas netyčia yra skiriamas gyvūnui, kuriam prieš tai nebuvo naudotas medetomidino (deksmedetomidino) hidrochloridas, jam gali pasireikšti hiperaktyvumas ir raumenų drebulys. Šie simptomai gali trukti maždaug 15 min.

Perdėtas kačių dirglumas geriausiai slopinamas mažinant išorinius dirgiklius.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: priešnuodis, α_2 -adrenoceptorų antagonistas.
ATCvet kodas: QV03AB90.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Atipamezolis yra stipriai veikianti ir selektyvi α_2 adrenerginių nervų receptorių blokuojanti medžiaga (α_2 -antagonistas), jis skatina CNS ir periferinės nervų sistemos noradrenaliną atpalaidavimą. Dėl simpatikomimetinės aktyvacijos stimuliuojama CNS. Kiti farmakodinaminiai efektai yra vidutinio stiprumo, pvz. poveikis širdies-kraujagyslių sistemai, tačiau naudojus atipamezolį pirmas 10 min. gali laikinai nežymiai sumažėti kraujo spaudimas.

Atipamezolis, kaip α_2 antagonistas naikina (ar slopina) α_2 receptorių aktyvinančios medžiagos, medetomidino ar deksmedetomidino, veikimą. Šunims ir katėms atipamezolis panaikina medetomidino (deksmedetomidino) hidrochlorido sedacinį poveikį ir gali trumpam padidinti širdies susitraukimų dažnį.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštas į raumenis atipamezolio hidrochloridas greitai rezorbuojasi. Didžiausia koncentracija CNS susidaro po 10–15 min. Pasiskirstymo tūris (Vd) yra apie 1–2,5 l/kg. Atipamezolio hidrochlorido pusinės eliminacijos laikas ($t_{1/2}$) yra apie 1 val. Atipamezolio hidrochloridas greitai ir visas biotransformuojamas. Metabolitai išskiriami daugiausiai su šlapimu ir nedidelis kiekis – su išmatomis.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilparahidroksibenzoatas (E 218),
natrio chloridas,
vandenilio chlorido rūgštis (pH reguliuoti),
natrio hidroksidas (pH reguliuoti),
injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais viename švirkšte.

Taip pat žr. 4.8 p.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo šviesos. Laikyti originalioje kartoninėje dėžutėje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Skaidrūs I tipo stiklo buteliukai po 10 ml, užkimšti I tipo brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 1, 5 ar 10 vnt.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

CP Pharma HandelsGES. mbH,
Ostlandring 13,
DE-31303 Burgdorf,
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

LT/2/07/1771/001-003

9. REGISTRACIJOS / PERREGISTRACIJOS DATA

2007-10-15 / 2012-06-02

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2012-05-25

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

REVERTOR 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml injekcinio tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

atipamezolio hidrochlorido 5 mg;

pagalbinių medžiagų:

metilparahidroksibenzoato (E 218) 1 mg.

natrio chlorido, vandenilio chlorido rūgšties, natrio hidroksido, injekcinio vandens.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje

5 buteliukai po 10 ml kartoninėje dėžutėje

10 buteliukų po 10 ml kartoninėje dėžutėje

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJOS

Atipamezolio hidrochloridas yra selektyvus α_2 -antagonistas, skirtas šunims ir katėms sedatyviniam medetomidino ar deksmedetomidino poveikiui panaikinti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

Švirkšti į raumenis vieną kartą.

Vaistą reikia švirkšti praėjus 15–60 min. po medetomidino hidrochlorido ar deksmedetomidino hidrochlorido švirkštimo.

Atsibudimo laikas sutrumpėja iki maždaug 5 min. Panaudojus preparatą, gyvūnas tampa judrus po maždaug 10 min.

8. IŠLAUKA

Išlauka: nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Žr. informacinio lapelio p. „Specialieji nurodymai“.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Atidarius būtina sunaudoti iki

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo šviesos.

Laikyti originalioje kartoninėje dėžutėje.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

CP Pharma Handelsges. mbH,
Ostlandring 13,
DE-31303 Burgdorf,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

LT/2/07/1771/001

LT/2/07/1771/002

LT/2/07/1771/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

REVERTOR 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

1 ml injekcinio tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

atipamezolio hidrochlorido 5 mg;

pagalbinių medžiagų:

metilparahidroksibenzoato (E 218) 1 mg.

natrio chlorido, vandenilio chlorido rūgšties, natrio hidroksido, injekcinio vandens.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

Švirkšti į raumenis.

5. IŠLAUKA

Išlauka: nenumatyta.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Atidarius būtina sunaudoti iki

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
REVERTOR 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

CP Pharma Handelsges. mbH,
Ostlandring 13,
DE-31303 Burgdorf,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

REVERTOR 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms
Atipamezolio hidrochloridas

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml injekcinio tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:	
atipamezolio hidrochlorido	5 mg;
pagalbinių medžiagų:	
metilparahidroksibenzoato (E 218)	1 mg.

4. INDIKACIJA

Atipamezolio hidrochloridas yra selektyvus α_2 -antagonistas, skirtas šunims ir katėms sedatyviniam medetomidino ar deksmedetomidino poveikiui panaikinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti veisiamiesiems šunims ir katėms bei gyvūnams, sergantiems kepenų ar inkstų ligomis. Taip pat žr. 12 p.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Per pirmąsias 10 min. sušvirkštus atipamezolio hidrochlorido gali trumpam sumažėti kraujospūdis. Retai gali padidėti aktyvumas, pasireikšti tachikardija, seilėjimasis, netipiškas lojimas, raumenų drebulys, vėmimas, padažnėjęs kvėpavimas, išmatų ir šlapimo nelaikymas. Labai retais atvejais gali pasireikšti pakartotinas raminamųjų poveikis arba nesutrumpėti pabudimo laikas panaudojus atipamezolį.

Katėms, naudojant nedidelėmis dozėmis medetomidino arba deksmedetomidino poveikio daliniam panaikinimui, galima hipotermija (net jei kilo dėl sedacijos).

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į raumenis vieną kartą.

Vaistą reikia švirkšti praėjus 15–60 min. po medetomidino hidrochlorido ar deksmedetomidino hidrochlorido švirkštimo.

Šunims atipamezolio hidrochlorido dozė į raumenis mikrogramais yra 5 kartus didesnė nei medetomidino hidrochlorido ar 10 kartų didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido. Šiame vaiste yra 5 kartus didesnė veikliosios medžiagos (atipamezolio hidrochlorido) koncentracija, lyginant su preparatais, kurių 1 ml yra 1 mg medetomidino hidrochlorido, ir 10 kartų didesnė koncentracija, lyginant su preparatais, turinčiais 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, todėl preparatus reikia skirti lygiomis dalimis.

Dozavimo pavyzdys šunims:

Medetomidino 1 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo šunims dozavimas
0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 40 µg/kg kūno svorio Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas 0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 20 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo šunims dozavimas 0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio

Katėms atipamezolio hidrochlorido dozė į raumenis mikrogramais yra 2,5 karto didesnė nei medetomidino hidrochlorido ar 5 kartus didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido. Šiame vaiste yra 5 kartus didesnė veikliosios medžiagos (atipamezolio hidrochlorido) koncentracija, lyginant su preparatais, kurių 1 ml yra 1 mg medetomidino hidrochlorido, ir 10 kartų didesnė koncentracija, lyginant su preparatais, turinčiais 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, todėl preparato reikia skirti perpus mažiau nei medetomidino ar deksmedetomidino.

Dozavimo pavyzdys katėms:

Medetomidino 1 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas	Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo katėms dozavimas
0,08 ml/kg kūno svorio, t. y., 80 µg/kg kūno svorio Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas 0,08 ml/kg kūno svorio, t. y., 40 µg/kg kūno svorio	0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio Revertor 5 mg/ml, injekcinio tirpalo katėms dozavimas 0,04 ml/kg kūno svorio, t. y., 200 µg/kg kūno svorio

Atsibudimo laikas sutrumpėja iki maždaug 5 min. Panaudojus preparatą, gyvūnas tampa judrus po maždaug 10 min.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. p. 8.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo šviesos. Laikyti originalioje kartoninėje dėžutėje.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki ...“.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Panaudojus preparatą, gyvūną reikia palikti ramioje aplinkoje. Atsibudimo metu gyvūnų negalima palikti be priežiūros. Prieš siūlant gyvūnui ėsti ar gerti, būtina įsitikinti, ar gyvūnas jau gali normaliai ryti.

Dėl skirtingų rekomenduotinių dozių preparatą būtina apdairiai naudoti ne pagal nurodymus ne paskirties rūšių gyvūnams.

Jei kartu su medetomidinu naudojami ir kiti raminamieji, reikia turėti omenyje, kad pastarųjų poveikis gali išlikti panaikinus medetomidino (deksmedetomidino) poveikį.

Atipamezolis nepanaikina ketamino poveikio, kuris gali sukelti šunims traukulius ir katėms mėšlungį. Naudojus ketaminą, atipamezolį galima naudoti tik praėjus 30–40 min.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atipamezolis stipriai veikia farmakologiškai, dėl to būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis, o atsitiktinai patekus reikia nedelsiant plauti švarių tekančiu vandeniu. Jei dirginimas išlieka, reikia kreiptis į gydytoją. Reikia nusivilkėti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda.

Vaistą reikia naudoti apdairiai ir stengtis atsitiktinai neiššivirkšti ar nepraryti. Atsitiktinai įsišivirkštus ar prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu, nes atipamezolio saugumas vaikingumui ir laktacijai nėra tinkamai ištirtas.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nerekomenduotina naudoti atipamezolį kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistais, pvz. diazepamu, acepromazinu ar opiatais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Atipamezolio hidrochlorido perdozavimas gali sukelti trumpalaikę trachikardiją ir padidėjusį judrumą (hiperaktyvumą, raumenų drebulį). Jei būtina, šiuos simptomus galima panaikinti skiriant medetomidino (deksmedetomidino) hidrochlorido dozę, kuri turi būti mažesnė nei paprastai naudojama klinikinė dozė.

Jei atipamezolio hidrochloridas netyčia yra skiriamas gyvūnui, kuriam prieš tai nebuvo naudotas medetomidino (deksmedetomidino) hidrochloridas, jam gali pasireikšti hiperaktyvumas ir raumenų drebulys. Šie simptomai gali trukti maždaug 15 min.

Perdėtas kačių dirglumas geriausiai slopinamas mažinant išorinius dirgiklius.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais viename švirkšte.

**13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2012-05-25

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Stiklo buteliukai po 10 ml, kartoninėse dėžutėse po 1, 5 ar 10 vnt.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.