TEXTO DEL PROSPECTO

MAXIVAC ® TETRA

Prevención de Moquillo, hepatitis, laringotraqueítis y leptospirosis (L. *canicola* y L. *icterohaemorrhagiae*).

COMPOSICION POR DOSIS (1 ml):

Virus del Moquillo Canino atenuado, cepa Lederle ..... $\geq 10^4$ $DICT_{50}$
Adenovirus Canino, tipo 2 atenuado, cepa Manhattan..... $\geq 10^4$ $DICT_{50}$
Leptospira interrogans serovar *icterohaemorrhagiae* inactivada ..... $\geq 10^9$ microorganismos
Leptospira interrogans serovar *canicola* inactivada ..... $\geq 10^9$ microorganismos

El CDV es el agente etiológico responsable de trastornos nerviosos, respiratorios y diarreas en perros, sobretodo en las primeras semanas de vida. El Adenovirus Canino tipo 1 (CADNV-1) es un virus que provoca hepatitis infecciosa canina y puede provocar problemas respiratorios. El Adenovirus Canino tipo 2 (CADNV-2) afecta al sistema respiratorio en perros infectados. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar el riñón y el hígado de los perros infectados. La vacunación con MAXIVAC®TETRA permite desarrollar inmunidad en perros susceptibles a la infección por estos agentes infecciosos.

Los efectos de esta vacuna consisten en provocar la inmunización contra el CDV, el CAV-1, el CAV-2 y las Leptospiras, mediante la utilización de virus atenuados (CDV atenuado, cepa Lederle; CAV-2 atenuado, cepa Manhattan) y bacterias inactivadas (*Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorragiae* inactivada y *Leptospira interrogans* serovar *canicola* inactivada), protegiendo a los animales vacunados frente a las enfermedades citadas.

INDICACIONES:

Perros: Prevención de moquillo, hepatitis, laringotraqueítis infecciosa canina (producida por el Adenovirus tipo 2) y leptospirosis (*L. icterohaemorrhagiae* y *L. canicola*). A partir de las 8 semanas de edad.

CONTRAINDICACIONES:

- No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infecto-contagiosa.
- No administrar en hembras gestantes.

EFECTOS SECUNDARIOS:

- Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea.

POSOLOGÍA:

Perros: Una dosis de 1 ml / perro, a partir de las 8 semanas de edad (independientemente de su edad, peso, sexo y raza).

Trasvasar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la fracción liofilizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración.

- Primera vacunación a partir de las 8 semanas y revacunación a las 12 semanas.
- Se recomienda una dosis de recuerdo anual.

TIEMPO DE ESPERA:

No procede.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Usar material estéril para su administración.
- Usar la vacuna inmediatamente después de ser reconstituida.
- Conservar la vacuna entre +2 y +8 °C al abrigo de la luz, también durante el transporte. No congelar.
- No mezclar con otras vacunas.
- En caso de inoculación accidental consultar inmediatamente a un médico y mostrar la etiqueta.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o Ios residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

PRESENTACIÓN:
Envase 1 dosis (1 vial de fracción liofilizada + 1 vial de fracción líquida).
Envase 10 dosis (10 viales de fracción liofilizada + 10 viales de fracción líquida).

Prescripción veterinaria
USO VETERINARIO
Reg. nº 1464 ESP

Titular y fabricante:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer- GIRONA (España)

Representante local:
Ecuphar Veterinaria S.L.U.
C/Cerdanya, 10-12 Planta 6º
08173 Sant Cugat del Vallés
(España)