

NOTICE

Vetalgin 500 mg/ml, solution injectable

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENTTitulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Pays-Bas

Fabricant responsable de la libération des lots:

Intervet International GmbH
D-85716 Unterschleißheim
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Vetalgin 500 mg/ml, solution injectable

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)Par ml:**Substance active:**

Métamizole sodique monohydrate 500 mg

4. INDICATION(S)

- Traitement de la douleur en cas de coliques.
- Maladies du système locomoteur (muscle, squelette).
- Affections accompagnées d'une hyperthermie et/ou de processus inflammatoires.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez des animaux atteints de maladies rénales et/ou hépatiques.

Ne pas utiliser chez des animaux atteints d'une dyshématopoïèse.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

- Risque d'hémorragies.
- Irritation et lésion gastro-intestinales, ulcères gastriques.
- Anomalies de l'hémogramme.
- Nécrose papillaire du rein.

Des cas isolés de réactions anaphylactiques ont été rapportés.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Bovin, porc et cheval.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Espèce animale	Posologie	Mode d'administration
Bovin*	40 mg de métamizole sodique par kg/pv (8 ml/100 kg)	- IM ou IV - unique
Porc	15-50 mg de métamizole sodique par kg/pv (3-10 ml/100 kg)	- IM - unique
Cheval	40-50 mg de métamizole sodique par kg/pv (8-10 ml/100 kg)	- IV - unique

* Le volume maximal à injecter est de 30 ml sur 1 site d'injection.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

L'injection par voie intraveineuse doit être appliquée lentement.

10. TEMPS D'ATTENTE

Ces temps d'attente sont valables pour une administration unique.

Espèce animale	Temps d'attente pour la viande	Temps d'attente pour le lait
Bovin*	12 jours	2 jours (4 traites)
Cheval	7 jours	-
Porc	3 jours	-

* Après administration de max. 30 ml sur 1 site d'injection.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.

Durée de conservation:

Le produit reste stable jusqu'à la date mentionnée sur l'emballage.
Flacon entamé: 28 jours.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte

Des études chez des animaux de laboratoire ont démontré que l'utilisation du métamizole sodique est sûre pendant la grossesse et la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

L'administration simultanée d'inducteurs d'enzymes microsomaux hépatiques (p.ex. phénylbutazone, barbituriques) diminue la demi-vie du métamizole et dès lors la durée d'activité. Ne pas administrer simultanément avec d'autres NSAIDs ou des glucocorticostéroïdes. L'administration simultanée de neuroleptiques, principalement de dérivés de la phénothiazine, peut provoquer une hypothermie grave.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

L'utilisation prolongée de métamizole peut provoquer une dépression de la moelle osseuse (leucopénie, agranulocytose).

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Octobre 2023

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mode de délivrance: Sur prescription du médecin vétérinaire.

Numéro d'enregistrement: BE-V068171