

MARKĒJUMS
V/NRP/97/0634

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba (100 ml flakonam)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Levamisol 100

100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Levamisolum

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Levamisols (levamizola hidrohlorīda veidā) 100 mg

Papildvielas:

Metil-p-hidroksibenzoāts 1,8 mg

Propil-p-hidroksibenzoāts 0,2 mg

u.c. palīgvielas

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem un aitām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas kuņģa-zarnu trakta pieaugušas un kāpuru stadijas nematodes (*Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*) un plaušu nematodes (*Dictyocaulus spp.*).

Cūkām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas plaušu un kuņģa-zarnu trakta nematodes (*Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.* un *Oesophagostomum spp.*).

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai. Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Neinjicēt vairāk par 15 ml Levamisol 100 vienā un tai pašā injekcijas vietā; pēc ievadīšanas masēt injekcijas vietu. Pirms zemādas injekcijas dezinficēt injekcijas zonu.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barselona), Spānija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/97/0634

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/NRP/97/0634

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba (250 ml flakonam)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Levamisol 100

100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Levamisolum

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Levamisols (levamizola hidrohlorīda veidā) 100 mg

Papildvielas:

Metil-p-hidroksibenzoāts 1,8 mg

Propil-p-hidroksibenzoāts 0,2 mg

u.c. palīgvielas

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem un aitām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas kuņģa-zarnu trakta pieaugušas un kāpuru stadijas nematodes (*Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*) un plaušu nematodes (*Dictyocaulus spp.*).

Cūkām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas plaušu un kuņģa-zarnu trakta nematodes (*Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.* un *Oesophagostomum spp.*).

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai. Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Neinjicēt vairāk par 15 ml Levamisol 100 vienā un tai pašā injekcijas vietā; pēc ievadīšanas masēt injekcijas vietu. Pirms zemādas injekcijas dezinficēt injekcijas zonu.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barselona), Spānija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/97/0634

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija