

**BIJLAGE I**

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN**

## 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Deltamethrine BF 1,056g, gemedicineerde halsband voor kleine tot middelgrote honden

## 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per halsband van 60 cm (26,40 g):

### Werkzaam bestanddeel:

Deltamethrine ..... 1,056 g

### Hulpstoffen:

Titaniumdioxide (E171) ..... 0,396 g

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

## 3. FARMACEUTISCHE VORM

Gemedicineerde halsband

Witte halsband

## 4. KLINISCHE GEGEVENS

### 4.1 Doeldiersoort

Hond (0-25 kg) voor kleine tot middelgrote honden

### 4.2 Indicatie(s) voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort(en)

De halsband heeft:

- Een afwerende werking (anti-voeding) tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 maanden.
- Een afwerende werking tegen steekmuggen (*Culex pipiens*) gedurende 6 maanden.

De halsband voorkomt:

- Tekeninfestatie gedurende 6 maanden.
- Vlooieninfestatie gedurende 4 maanden.

Het afwerende effect (anti-voeding) tegen *Phlebotomus* spp. is aangetoond, dus kan het worden beschouwd als onderdeel van het preventieprogramma voor Leishmaniase en de steekmuggen van de soort *Culex pipiens*.

### 4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.  
Niet gebruiken bij honden met huidlaesies. Niet gebruiken bij pups jonger dan zeven weken.  
Niet gebruiken bij katten.

#### **4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is**

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden. Teken zouden binnen 24 tot 48 uur na infestatie dood moeten gaan en van de gastheer af moeten vallen zonder het nemen van een bloedmaaltijd, maar het is mogelijk dat een enkele teek zich toch vasthecht na behandeling. De transmissie van ziekten overgebracht door teken kan dus niet worden uitgesloten. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van infectieuze ziekten overgebracht door zandvliegen niet volledig worden uitgesloten.

#### **4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik**

##### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het effect van wassen met shampoo op de effectiviteit van het diergeneesmiddel is niet onderzocht.

##### Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan het dier toedient

Accidentele ingestie van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder neurotoxische effecten. Bewaar de sachet met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik.

Voorkom dat kinderen met de halsband in aanraking komen, er mee spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of met de hond die de halsband draagt (laat bijvoorbeeld dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaar), in het bijzonder bij kinderen.

Roken, eten of drinken is niet toegestaan tijdens het hanteren van de halsband. Houd de halsband weg bij eten, drinken en diervoeding.

In geval van accidentele orale blootstelling of ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Deltamethrine kan overgevoelighedsreacties (allergieën) veroorzaken bij gevoelige personen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deltamethrine moeten contact met het diergeneesmiddel en het behandelde dier vermijden. Raadpleeg een arts indien een allergische reactie optreedt.

##### Overige voorzorgsmaatregelen

Deltamethrine is giftig voor waterorganismen. Verwijder de halsband voor dat de hond gaat zwemmen of in bad gaat om bijwerkingen bij waterorganismen te vermijden. Voorkomen moet worden dat honden in water zwemmen gedurende de eerste vijf dagen dat ze de halsband dragen.

#### **4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)**

In zeldzame gevallen is het volgende waargenomen:

- lokale allergische reacties (jeuk, erytheem, haaruitval) in de hals of van de huid in het algemeen, wat kan duiden op lokale of een algemene overgevoelighedsreactie.

- gastro-intestinale symptomen zoals braken, diarree en hypersalivatie.
- neuromusculaire problemen zoals ataxie en spiertremoren.

Bovendien zijn in zeldzame gevallen afwijkend gedrag (bv. lethargie of hyperactiviteit), af en toe geassocieerd met huidirritatie, waargenomen.

De symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van de halsband. De behandeling is symptomatisch omdat er geen specifiek antidotum bekend is.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

#### **4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg**

Er zijn geen secundaire effecten waargenomen bij drachtige teven en teven in de lactatieperiode, ook niet bij puppy's van moeders die een halsband droegen tijdens de lactatieperiode.


#### **4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparasiticiden (pyrethroiden of organofosfaten).

#### **4.9 Dosering en toedieningsweg**

Uitwendig gebruik. Eén halsband per hond. De 60 cm lange halsband dient gebruikt te worden bij kleine tot middelgrote honden. De halsband past bij honden met een nekomtrek tot 48 cm (60 cm).

Verwijder de halsband uit de verpakking en verwijder de comfort strip. Bevestig de halsband rond de nek van het dier zonder hem te strak te trekken. Houd een afstand van 2 vingers tussen de halsband en de nek. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp.



Deze halsband is ontworpen met een veilig afsluitmechanisme (anti-wurg veiligheid). In het onwaarschijnlijke geval dat de hond vast komt te zitten met de halsband, is de eigen kracht van de hond voldoende om de halsband te verwijderen zodat de hond zichzelf snel los kan maken.

#### **4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk**

In geval van accidentele ingestie van de halsband door de hond, neem contact op met uw dierenarts. De volgende symptomen van intoxicatie kunnen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremoren, hypersalivatie, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur. In geval van accidentele ingestie, dient de eigenaar van het dier contact op te nemen met een dierenarts, zonder een symptomatische behandeling op te starten. De dierenarts dient te beoordelen of een symptomatische behandeling noodzakelijk is.

#### **4.11 Wachtijd(en)**

Niet van toepassing.

### **5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

Farmacotherapeutische groep: ectoparasitociden, insecticiden en afwerende middelen, pyrethrines en pyrethroïden.

ATCvet-code: QP53AC11.

#### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

Deltamethrine, het farmacologisch werkzame bestanddeel van de halsband, is een molecuul dat behoort tot de familie van synthetische pyrethroiden (Type-II), wordt gekarakteriseerd door een acaricide en insecticide werking. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op verandering van de permeabiliteit van natriumkanalen, hetgeen resulteert in hyperexcitatie, gevolgd door verlamming (shock effect), tremoren en de dood van de parasiet. Deltamethrine heeft een afwerend effect tegen phlebotomen, vectoren van *Leishmania infantum* (protozo, veroorzaakt Leishmaniase).

#### **5.2 Farmacokinetische eigenschappen**

Deltamethrine komt continu vrij uit de halsband in de vacht en in het vette laagje dat de huid bedekt. Het werkzame bestanddeel verspreidt zich door direct contact over het huidoppervlak via de lipiden en in het haar. Opname van deltamethrine via de huid is laag.

### **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

#### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

Polyvinylchloride

Calciumstearaat

Sojaolie, geëpoxydeerd

Di-iso-octyladipaat

Titaniumdioxide (E171)

Trifenyfosfaat

Calcium zinkstearaat

#### **6.2 Belangrijke onverenigbaarheden**

Niet van toepassing.

#### **6.3 Houdbaarheidstermijn**

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken.

#### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Bewaar de sachets in de kartonnen/metalen buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

## **6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking**

Iedere halsband is verpakt in een verzegeld sachet van polyethyleen tereftalaat-aluminiumpolypropyleen.

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen of metalen doos met één sachet met 1 halsband van 60 cm.

Kartonnen of metalen doos met twee sachets met 1 halsband van 60 cm.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

## **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het diergeneesmiddel**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Deltamethrine is giftig voor bijen, vissen en andere waterorganismen. Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Gooi de halsband na gebruik niet in het milieu of water.

## **7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Gran Via Carles III, 98, 7<sup>a</sup>

08028 Barcelona

Spanje

## **8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 127058

## **9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste vergunningverlening: 1 december 2020

## **10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

14 juni 2024

**KANALISATIE**

VRIJ

**BIJLAGE II**  
**ETIKETTERING EN BIJSLUITER**

## **A. ETIKETTERING**



**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

**Kartonnen / metalen doos**

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Deltamethrine BF 1,056g, gemedicineerde halsband voor kleine tot middelgrote honden  
Deltamethrine

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL**

Per halsband van 60 cm (26,40 g):

Werkzaam bestanddeel:  
Deltamethrine ..... 1,056 g

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Gemedicineerde halsband

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

1 x 60 cm, 2 x 60 cm

**5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond

**6. INDICATIE(S)**

De halsband heeft:

- Een afwerende werking (anti-voeding) tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 maanden.
- Een afwerende werking tegen steekmuggen (*Culex pipiens*) gedurende 6 maanden.

De halsband voorkomt:

- Tekeninfestatie gedurende 6 maanden.
- Vlooiëinfestatie gedurende 4 maanden.

Het afwerende effect (anti-voeding) tegen *Phlebotomus* spp. is aangetoond, dus kan het worden beschouwd als onderdeel van het preventieprogramma voor Leishmaniase en de steekmuggen van de soort *Culex pipiens*.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor honden met een nekomtrek tot 48 cm.  
Anti-wurg veiligheid.

**8. WACHTTIJD(EN)**

Niet van toepassing.

**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**

Lees vóór gebruik de bijsluiter. Bewaar in de originele verpakking tot gebruik om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met het diergeneesmiddel. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen.

**10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP {maand/jaar}  
Na openen direct gebruiken.

**11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaar de sachets in de buitenverpakking.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-  
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN  
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET  
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. VRIJ

**14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE  
HANDEL BRENGEN**

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.  
Gran Via Carles III, 98, 7<sup>a</sup>  
08028 - Barcelona  
Spanje

**16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 127058

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

<Batch><Lot> {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**

Sachet

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Deltamethrine BF 1,056g  
Deltamethrine



**2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**



**3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP {maand/jaar}

**4. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. – VRIJ

**6. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 127058

**B. BIJSLUITER**

## BIJSLUITER

### Deltametrine BF 1,056g, gemedicineerde halsband voor kleine tot middelgrote honden

#### 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.  
Gran Via Carles III, 98, 7<sup>a</sup>  
08028 Barcelona  
Spanje

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

AB7 SANTE  
Chemin des Monges  
31450 Deyme  
Frankrijk

#### 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Deltamethrine BF 1,056g, gemedicineerde halsband voor kleine tot middelgrote honden

Deltamethrine

#### 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per halsband van 60 cm (26,40 g):

**Werkzaam bestanddeel:**

Deltamethrine .....1,056 g

**Hulpstoffen:**

Titaniumdioxide (E171) ..... 0,396 g

Witte gemedicineerde halsband

#### 4. INDICATIE(S)

De halsband heeft:

- Een afwerende werking (anti-voeding) tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 maanden.
- Een afwerende werking tegen steekmuggen (*Culex pipiens*) gedurende 6 maanden.

De halsband voorkomt:

- Tekeninfestatie gedurende 6 maanden.
- Vlooiëinfestatie gedurende 4 maanden.

Het afwerende effect (anti-voeding) tegen *Phlebotomus* spp. is aangetoond, dus kan het worden beschouwd als onderdeel van het preventieprogramma voor Leishmaniase en de steekmuggen van de soort *Culex pipiens*.

## **5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij pups jonger dan zeven weken.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij katten.

Niet gebruiken bij honden met huidlaesies.

## **6. BIJWERKINGEN**

In zeldzame gevallen is het volgende waargenomen:

- lokale allergische reacties (jeuk, erytheem, haaruitval) in de hals of van de huid in het algemeen, wat kan duiden op lokale of een algemene overgevoeligheidsreactie.
- gastro-intestinale symptomen zoals braken, diarree en hypersalivatie.
- neuromusculaire problemen zoals ataxie en spiertremoren.

Bovendien zijn in zeldzame gevallen afwijkend gedrag (bv. lethargie of hyperactiviteit), af en toe geassocieerd met huidirritatie, waargenomen.

De symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van de halsband. De behandeling is symptomatisch omdat er geen specifiek antidotum bekend is.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## **7. DOELDIERSOORT**


Hond (0-25 kg) voor kleine tot middelgrote honden

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.**

Eén halsband per hond. De 60 cm lange halsband dient gebruikt te worden bij kleine tot middelgrote honden. De halsband past bij honden met een nekomtrek tot 48 cm.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Verwijder de halsband uit de verpakking en verwijder de comfort strip. Bevestig de halsband rond de nek van het dier zonder hem te strak te trekken. Twee vingers zouden tussen de halsband en de nek van de hond moeten passen. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp.



Deze halsband is ontworpen met een veilig afsluitmechanisme (anti-wurg veiligheid). In het onwaarschijnlijke geval dat de hond vast komt te zitten met de halsband, is de eigen kracht van de hond voldoende om de halsband te verwijderen zodat de hond zichzelf snel los kan maken.

## **10. WACHTTIJD**

Niet van toepassing.

## **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaar de sachets in de kartonnen/metalen buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket of de doos na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)**

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden. Teken zouden binnen 24 tot 48 uur na infestatie, zonder een bloedmaaltijd te hebben gehad, dood moeten gaan en van de gastheer af moeten vallen, maar het is mogelijk dat een enkele teek zich toch vasthecht na behandeling. De transmissie van ziekten door teken kan dus niet worden uitgesloten. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen niet volledig worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Het effect van wassen met shampoo op de effectiviteit van het diergeneesmiddel is niet onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan het dier toedient:

Accidentele ingestie van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder neurotoxische effecten. Bewaar de sachet met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik.



Voorkom dat kinderen met de halsband in aanraking komen, spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of met de hond die de halsband draagt (laat bijvoorbeeld dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaar), in het bijzonder bij kinderen.

Roken, eten of drinken is niet toegestaan tijdens het hanteren van de halsband. Houd de halsband weg bij eten, drinken en diervoeding.

In geval van accidentele orale blootstelling of ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Deltamethrine kan overgevoeligheidsreacties (allergieën) veroorzaken bij gevoelige personen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deltamethrine moeten contact met het diergeneesmiddel en het behandelde dier vermijden. Raadpleeg een arts indien een allergische reactie optreedt.

Overige voorzorgsmaatregelen:

Deltamethrine is giftig voor waterorganismen. Verwijder de halsband voor dat de hond gaat zwemmen of in bad gaat om bijwerkingen bij waterorganismen te vermijden. Voorkomen moet worden dat honden in water zwemmen gedurende de eerste vijf dagen dat ze de halsband dragen.

Dracht en lactatie:

Er zijn geen secundaire effecten waargenomen bij drachtige teven en teven in de lactatieperiode, ook niet bij puppy's van moeders die een halsband droegen tijdens de lactatieperiode.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparacitiden (pyrethroïden of organofosfaten).

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

In geval van accidentele ingestie van de halsband door de hond, neem contact op met uw dierenarts. De volgende symptomen van intoxicatie kunnen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremoren, hypersalivatie, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur. In geval van accidentele ingestie, dient de eigenaar van het dier contact op te nemen met een dierenarts, zonder een symptomatische behandeling op te starten. De dierenarts dient te beoordelen of een symptomatische behandeling noodzakelijk is.

Onverenigbaarheden:

Niet van toepassing.

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-  
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Deltamethrine is giftig voor bijen, vissen en andere waterorganismen. Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Gooi de halsband na gebruik niet in het milieu of water. Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

14 juni 2024

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen of metalen doos met één sacht met 1 halsband van 60 cm.

Kartonnen of metalen doos met twee sachtets met 1 halsband van 60 cm.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 127058

**KANALISATIE**

**VRIJ**