

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK
CÍMKE (HASZNÁLATI UTASÍTÁS) 100 g, 1 kg, 5 kg

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Kon-Pharma GmbH.

Senator Bauer str. 34, 30625 Hannover, Németország

A felszabadításért felelős gyártó:

Pharmawerk Wienböhla GmbH.


Poststrasse 58, 01689 Weinböhla, Németország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Doxy 50 por belsőleges oldathoz A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:	Doxiciklin (hiklát formában)	500,0 mg
Vivőanyagok:	laktóz ad	1000,0 mg



4. JAVALLAT

A doxiciklin széles spektrumú, hosszú hatástartamú antibiotikum, amely alkalmas az arra érzékeny Gram pozitív kórokozók által előidézett szisztémás, légzőszervi és egyéb fertőzések kezelésére.

Sertések esetében az *Actinobacillus pleuropneumoniae* okozta tüdő- és mellhártyagyulladás, a *M. hyopneumoniae* okozta enzoociás tüdőgyulladás, a *P. multocida*, *B. bronchiseptica* okozta torzító orrgyulladás gyógykezelésére.

Házityúk (brojlercsirke), pulyka *Mycoplasma gallisepticum* okozta idült légzőszervi betegségének (CRD) és *M. synoviae* okozta ízületgyulladásának kezelésére, *Pasteurella* spp. okozta betegségek gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Ismert doxiciklin, vagy tetraciklin túlérzékenység.

Máj-, vagy veseelégtelenség, vérszegénység esetén nem alkalmazható.

6. MELLÉKHATÁSOK

A doxiciklin májkárosodást és emésztőszervi rendellenességet okozhat. A kezelt állatoknál fényérzékenység léphet fel. A növekedésben lévő állatok kezelése után a fogak barnás elszíneződése tapasztalható.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés, házityúk (brojlercsirke) és pulyka.

8. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Adagolás: A doxiciklin általános adagja sertéseknek: 20 mg/ttkg/nap, amely megfelel 0,5 g/liter Doxy 50 készítménynek. Csirkéknek és pulykáknak 30 mg doxiciklin/ttkg/nap, ivóvízben. Ez megfelel csirkék esetén 0,5 g/liter Doxy 50 készítménynek, pulykák esetén 0,4 g/liter Doxy 50 készítménynek.

Alkalmazás módja: szájon át, ivóvízben oldva.

Alkalmazási útmutató: A készítmény kizárólag antibiotikum-érzékenységi vizsgálat után, annak eredménye szerint alkalmazható. A gyógyszeres ivóvíz pH-ja a semleges érték körül legyen. Az alkalmazás időtartama sertések esetén 8, baromfinál 5 nap.

9. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés ehető szövetek: 6 nap, házityúk (brojlercsirke) és pulyka ehető szövetek: 11 nap:

A készítménnyel árutojást termelő tojóállományok nem kezelhetők!

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25 °C alatt, hűvös, száraz helyen, fénytől védve, tárolandó.

11. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: {hónap/év, 00/0000-ig}

Ivóvízbe keveréskor 1 nap, ezért minden nap friss gyógyszeres oldatot kell készíteni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz:

Az elfogyasztott ivóvíz mennyiségét jelentősen befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó biztonsági óvintézkedések

Kerüljük a készítménnyel való közvetlen érintkezést! Bekeverésekor védőszemüveg, porálarc (EN140FFP1), védőruha kötelező. Kerüljük az oldat bőrre, szembe, nyálkahártyára jutását. Allergiás tünetek (kiütés, izzadás, nehezített légzés) jelentkezésekor a készítmény használati utasításával együtt haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2008. április 25.

15. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, amennyiben alkalmazható

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

16. GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

17. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2372/1/08 MgSzH ÁTI (100 g)

2372/2/08 MgSzH ÁTI (1 kg)

2372/3/08 MgSzH ÁTI (5 kg)

18. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: {szám}

