

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

L-Spec Inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml, Injektionslösung.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml:

Lincomycin (als Lincomycin Hydrochloro Monohydrat) 50 mg

Spectinomycin (als Spectinomycin Dihydrochloro Pentahydrat) 100 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Essbare Gewebe: 14 Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

V.M.D. n.v.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V193076

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Glasfläschchen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

L-Spec Inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml, Injektionslösung.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml:

Lincomycin (als Lincomycin Hydrochloro Monohydrat) 50 mg

Spectinomycin (als Spectinomycin Dihydrochloro Pentahydrat) 100 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Schwein

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Injektionslösung

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Essbare Gewebe: 14 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

V.M.D. n.v.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot