

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### GEBRAUCHSINFORMATION

Hormeel LT ad us. vet.

#### NAME UND ANSCHRIFT DES INHABERS DER REGISTRIERUNG UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Telefon: 07221-50100

Telefax: 07221-501210

E-Mail: info@heel.de

#### BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hormeel LT ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Heimtiere (Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel)

#### WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält:

##### Wirkstoffe:

Acidum nitricum	DIL	D4	2,5 mg
Aquilegia vulgaris	DIL	D4	5,0 mg
Capsella bursa-pastoris	DIL	D4	5,0 mg
Conyza canadensis	DIL	D4	5,0 mg
Cyclamen purpurascens	DIL	D4	2,5 mg
Cypripedium parviflorum var. pubescens	DIL	D8	5,0 mg
Myristica fragrans	DIL	D6	5,0 mg
Origanum majorana	DIL	D4	5,0 mg
Pulsatilla pratensis	DIL	D4	2,5 mg
Senecio nemorensis ssp. fuchsii	DIL	D4 (HAB, Vorschrift 3a)	5,0 mg
Strychnos ignatii	DIL	D6	2,5 mg
Viburnum opulus	DIL	D4	5,0 mg
Calcium carbonicum Hahnemanni	DIL	D8 aquos	5,0 mg
Sepia officinalis	DIL	D6 aquos	250,0 mg

Die Wirkstoffe 1 bis 12 sowie 13 und 14 werden jeweils über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.

##### Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

#### ANWENDUNGSGEBIET

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

## **GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

## **NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

## **ZIELTIERARTEN**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Heimtiere (Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel)

## **DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Hormeel LT ad us. vet. zur subkutanen Injektion.

### Standarddosierung:

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 10 ml
Pferd, Rind (bis zu 500 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 5 ml
Schwein:	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-5 ml
Schaf, Ziege:	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml
Großer Hund (über 25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml
Mittelgroßer Hund (15-25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 2 ml
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:	1 mal täglich die Einzeldosis von 1-2 ml
Kleine Heimtiere (über 0,5 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 0,5 ml
Kleine Heimtiere (bis zu 0,5 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 0,05 - 0,5 ml

### Initial-/Akutdosierung:

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Einzeldosis anfangs nach 12 Stunden wiederholt werden, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1-4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Hormeel LT ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

## **WARTEZEITEN**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege:	Essbare Gewebe:	Null Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege:	Milch:	Null Stunden

## **BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

### **BESONDERE WARNHINWEISE**

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Eine Injektion sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

#### Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Keine bekannt.

#### Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Zur Verträglichkeit von Horneel LT ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren bzw. in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation sowie in der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Horneel LT ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

### **GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

### **WEITERE ANGABEN**

Packungsgrößen: 5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Horneel LT ad us. vet. ist eine klare, farblose Injektionslösung.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: