

## NAVODILO ZA UPORABO

### SEDALIN Gel 350 mg/10 ml peroralni gel za pse in konje

#### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

Vetoquinol Biowet Sp.z.o.o.  
Kosynierow Gdynskich ulica 13/14  
66-400 Gorzow Wlkp.  
Poljska

#### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SEDALIN Gel 350 mg/10 ml peroralni gel za pse in konje

#### 3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

Homogen, rumeno-oranžen, prozoren gel

10 ml gela vsebuje:

**Zdravilno učinkovino:**

Acepromazin 350 mg (v obliki acepromazinijevega maleata 475 mg)

**Pomožne snovi:**

Metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, natrijev acetat trihidrat, natrijev ciklamat, hidroksietilcelulozo, glicerol, 85 odstotni, prečiščeno vodo.

#### 4. INDIKACIJE

Psi

Sedacija: pomiritev živali med fiksacijo in pregledom, pri živčnosti, v stresnih situacijah, pri prekomerni mišični tenziji in med transportom. Uvod (premedikacija) v anestezijo in simptomatska terapija pri bruhanju, slabosti pri vožnji.

Konji

Sedacija: pomiritev živali med fiksacijo in pregledom, pri živčnosti, v stresnih situacijah, pri prekomerni mišični tenziji in med transportom. Uvod v anestezijo in simptomatska terapija pri bruhanju, slabosti pri transportu.

#### 5. KONTRAINDIKACIJE

Šok, vznemirjenost živali, tetanije in epilepsija. Zdravila ne uporabljati pri bregih živalih.

#### 6. NEŽELENI UČINKI

Pri psih se lahko pojavi zmanjšan arterijski krvni pritisk in bradikardija, posebno občutljivi so bokserji. Po aplikaciji acepromazina se lahko pojavičasna hipotermija, reverzibilne spremembe v krvni sliki: lahko pride dočasno zmanjšane števila eritrocitov, trombocitov in levkocitov ter do zmanjšane količine hemoglobina. Acepromazin poveča sekrecijo prolaktina in lahko povzroči plodnostne motnje. Zaradi relaksacije mišice retraktorja penisa lahko pride do izpada penisa. Stanje se normalizira v 2-3 urah. Če se penis ne vrne v normalen položaj, takoj kontaktirajte veterinarja. Acepromazin lahko včasih povzroči strangulacijo glansa penisa in prolongira erekcijo.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

## **7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi, konji.

## **8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Zdravilo se daje peroralno. Vrh brizge se vstavi v usta na notranjo stran lic in vbrizga priporočen odmerek zdravila.

Psi:

Rahla sedacija	1,0 mg / kg t.m.	0,5 ml / 17,5 kg t.m.
Srednja sedacija	2,0 mg / kg t.m.	1,0 ml / 17,5 kg t.m.
Močna sedacija	3,0 mg / kg t.m.	1,5 ml / 17,5 kg t.m.

Konji:

Rahla sedacija	0,1-0,2 mg / kg t.m.	2 - 3 ml / 500 kg t.m.
Srednja sedacija	0,3-0,4 mg / kg t.m.	4 - 6 ml / 500 kg t.m.

## **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Pred uporabo pravilno določite odmerek. Zdravilo aplicirajte počasi in v primeru kakršne koli neželene reakcije, takoj prenehajte z dajanjem zdravila.

## **10. KARENCA**

Psi: ni smiselno.

Konji: meso in organi: 6 mesecev

## **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

## **12. POSEBNA OPOZORILA**

Zdravila ne uporabljajte pri tekmovalnih konjih.

Psi pasme bokser so zelo občutljivi na učinkovino, zato je potrebna pri njih posebna pozornost pri dajanju.

## **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

## **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO**

12.07.2012

## **15. DRUGE INFORMACIJE**

### **Vrsta vsebnika**

15 ml brizga za peroralno dajanje; bat brizge z vrtečim se obročkom, zaprta z belim pokrovčkom.  
Vsebuje 10 ml peroralnega gela.

**Številka dovoljenja za promet:** NP/V/0311/001

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Vetconsult pharma d.o.o.  
Gerbičeva 50  
1000 Ljubljana