

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Penethaone 236,3 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder
Penethamathydroiodid

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Durchstechflasche mit Pulver: 5 000 000 IE (4726 mg) Penethamathydroiodid
Durchstechflasche mit Lösungsmittel: 18 ml

Durchstechflasche mit Pulver: 10.000.000 IE (9452 mg) Penethamathydroiodid
Durchstechflasche mit Lösungsmittel: 36 ml

1 ml der rekonstituierten Suspension enthält 250 000 I.E. (236,3 mg) Penethamathydroiodid.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x (5 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml Lösungsmittel)
5 x (5 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml Lösungsmittel)
10 x (5 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 18 ml Lösungsmittel)
1 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 36 ml Lösungsmittel)
5 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit 36 ml Lösungsmittel)
10 x (10 000 000 I.E. Durchstechflasche mit Pulver 1 und Durchstechflasche mit 36 ml Lösungsmittel)

5. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kühe während der Laktation)

6. ANWENDUNGSGEBIET**7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskulär (i.m.)
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 2,5 Tage (60 Stunden)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Penicilline und Cephalosporine können gelegentlich schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen zur Verwendung finden Sie in der Packungsbeilage.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Einmal geöffnet sofort wieder herstellen. Nach der Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden (2-8 °C) verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Die rekonstituierte Injektionssuspension für maximal 24 Stunden. im Kühlschrank (2-8°C) lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Divasa-Farmavic S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 Gurb – Vic, Barcelona
SPANIEN

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V482995 (Pulver Glas Type I + Lösungsmittel Glas Type II)
BE-V482986 (Pulver Glas Type II + Lösungsmittel Glas Type II)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**ETIKETT DER DURCHSTECHFLASCHE AUS GLAS (PULVER)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Penethaone 236,3 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

Penethamathydroiodid

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Jede Durchstechflasche enthält: 5 000 000 I.E. Penethamathydroiodid

Jede Durchstechflasche enthält 10 000 000 I.E. Penethamathydroiodid

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5 000 000 I.E.

10 000. 000 I.E.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskulär (i.m.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: 2,5 Tage (60 Stunden)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Einmal geöffnet sofort wieder herstellen. Nach der Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden (2-8 °C) verbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

**MINDESTANGABEN AUFKLEINEN BEHÄLTNISSEN
ETIKETT DER DURCHSTECHFLASCHE AUS GLAS (LÖSUNGSMITTEL)****1. BEZEICHUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lösungsmittel für Penethaone 236,3 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

mathydroiodid

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

18 ml

36 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.