

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/02/1442

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Immunair 17.5 suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivētas *Cutibacterium acnes* (*Propionibacterium acnes*) baktērijas 0,17 mg
Escherichia coli baktēriju lipopolisaharīds 0,05 mg

Palīgvielas:

Tiomersāls 0,10 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai.
Bezkrāsaina suspensija.

4. KLĪNISKIE DATI

4.1 Mērķa sugas

Vistas (broileri, dējējvistas, vaislas vistas).

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Vistām, broileriem, jaunputniem, dējējvistām un vaislas vistām:

Immunair 17.5 palielina imunitāti pret Mareka slimību vakcinētiem putniem, lietojot to ar trīs nedēļu intervālu pēc vakcinācijas.

Zāles palielina aizsardzību pret infekciozā bursīta infekciju putniem.

Zootehniskajiem parametriem nodarīto kaitējumu samazināšanai, ko izraisa inficēšanās ar *Mycoplasma gallisepticum*.

Putnu mirstības un zootehniskajiem parametriem nodarīto kaitējumu samazināšanai, ko izraisa putnu leikozes vīrusa J serotipa infekcija.

Samazina bojājumus, ko rada infekciozā bursīta vīruss.

Ieteicams lietot putniem gadījumos, kad ir pastiprināta stresa ietekme un pastiprināta jutība pret infekcijas slimībām.

4.3 Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Nav.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav zināma.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9 Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pievienot dzeramajam ūdenim devā 0,5-1 ml *Inmunair 17.5* uz 10 kg ķermeņa svara dienā, 3 dienas pēc kārtas.

Cāļiem minimālais lietošanas vecums ir pirmā dzīvības diena.

Devas:

Broileriem: lietot 0,5-1 ml zāļu/10 kg ķermeņa svara pirmajās 3 dzīves dienās. Var atkārtot 21 dienas vecumā.

Dējējvistām un vaislas vistām: lietot 0,5-1 ml zāļu/10 kg ķermeņa svara pirmajās 3 dzīves dienās. Atkārtoti lietot 10-12 un 18-23 nedēļu vecumā.

Pirms lietošanas zāles rūpīgi samaisīt ar dzeramo ūdeni.

Lietošana atkarīga no vakcinācijas programmas, stresa vai pasīvās imunitātes nepietiekamības.

Zāles izšķīdināt ūdens daudzumā, ko putni izdzer 2 stundu laikā, ņemot vērā putnu ķermeņa svaru un vecumu. Lai nodrošinātu pilnīgu paredzētās zāļu devas uzņemšanu, pirms tam ierobežot dzeramā ūdens padevi.

Sagatavoto zāļu saturošo ūdeni izlietot nekavējoties.

Ārstēšanas laikā visiem putniem nodrošināt neierobežotu piekļuvi zāles saturošajam ūdenim.

Pēc zāļu saturošā ūdens izdzeršanas, atjaunot tīra dzeramā ūdens padevi.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Desmitkārtīgi pārsniedzot terapeitisko zāļu devu, pārbaudes testā blakusparādības netika novērotas.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi un imūnmodulatori, imūnstimulatori.

ATĶ vet kods: QL03A.

E.coli lipopolisaharīdi aktivizē makrofāģus, izraisa B limfocītos proliferatīvu reakciju un to diferenciēšanos plazmocītos, kuri producē antivielas. *Propionbacterium* spēj ierosināt šūnu imunitāti, stimulēt citokīnu produkciju.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Tiomersāls
Polivinilpirolidons
Kālija dihidrogēnfosfāts
Nātrijs hidroksīds
Ūdens injekcijām

6.2 Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.
Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).
Sargāt no tiešiem saules stariem.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

50 ml un 100 ml flakoni, 250 ml un 500 ml pudeles no augsta spiediena izturīga polietilēna, noslēgti ar bromobutilgumijas aizbāzni un alumīnija vai metāla vāciņu.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

LABORATORIOS CALIER, S.A.
c/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)
LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona)
Spānija
Tel: 93-849.5133 – Fax: 93-840.1398

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/02/1442

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 30/05/2002

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20/12/2007

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2019

**RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS**

Recepšu veterinārās zāles.