

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Alphafluben 50 mg/g, vaistinis premikšas kiaulėms ir vištomis

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviena gramė yra:

veikliosios medžiagos:

flubendazolo 50 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Vaistinis premikšas.

Balti ar rusvai balti milteliai be mechaninių priemaišų, gumulėlių ar telkinių.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Kiaulės (penimos), vištos (broileriai)

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Apsikrėtimų, sukeltų toliau nurodytų subrendusių ir nesubrendusių stadijų nematodų gydymas:

Kiaulės: *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus* (raudona skrandžio kirmėlė), *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis* ir *Strongyloides ransomi* (tik suaugusių forma).

Vištos: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti balandžiams ir papūgoms.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pasireiškus infekcijai su klinikiniais simptomais, būtina gydyti visus vienas su kitu kontaktuojančius gyvūnus ir būtina imtis atitinkamų zoohigieninių priemonių.

Būtina vengti toliau išvardintų veiksmų, nes jie didina atsparumo išsivystymo riziką ir gali lemti gydymo neveiksmingumą:

- pernelyg dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės antihelminčių vaistų naudojimas ilgą laiką;
- per mažos dozės naudojimas, dėl netinkamai įvertinto kūno svorio, neteisingo vaisto naudojimo arba nekalibruoto dozavimo prietaiso (jei toks naudojamas).

Įtariamus klinikinius atsparumo antihelminčiams vaistams atvejus reikia ištirti atitinkamais tyrimais (pvz., kiaušinėlių skaičiaus išmatose sumažėjimo tyrimu). Jei tyrimo (-ų) rezultatai

rodo atsparumą tam tikriems antihelmintikams, reikia naudoti kitai farmakologinei klasei priklausančią antihelmintiką, kuris pasižymi kitokiu veikimo mechanizmu.

Dėl pernelyg dažno ir pakartotinio tos pačios klasės antihelmintinių vaistų naudojimo ilgą laiką gali išsivystyti atsparumas benzimidazolams (į kuriuos įeina flubendazolas). Dėl šios priežasties šis vaistas turi būti naudojamas remiantis vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija dėl jautrumo nematodams bei rekomendacijomis, kaip sumažinti tolesnę atranką dėl atsparumo antihelmintiniams vaistams.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Netaikytinos..

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams.

Žmonės turi vengti atsitiktinio prarijimo. Esant sąlyčiui su oda, gali pasireikšti jautrumas. Gali dirginti odą ir akis. Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas flubendazolui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – kombinezonas ir nelaidžios pirštinės.

Patekus ant odos, nuplauti paveiktas vietas. Netyčia patekus į akis, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei naudojant galimas dulkių poveikis, naudoti arba vienkartinį filtrą ant vienkartinės puskaukės-respiratoriaus, atitinkantį Europos standartą EN149, arba daugkartinį respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN140, su filtru, atitinkančiu EN 143.

Jei panaudojus vaistą pasireiškia alergijos simptomai, pvz., odos bėrimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį. Veido, lūpų ir akių vokų patinimas bei sunkus kvėpavimas yra rimti simptomai, kuriems pasireiškus reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Naudojant šį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Panaudojus, nusiplauti rankas muilu ir vandeniu.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma taikant terapines dozes.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo metu.

Galima naudoti kiaušinių dėjimo metu.

Flubendazolas neturi įtakos kiaušinių perimui.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudojimo metodas

Naudoti per burną. Naudoti tik su pašaru.

Siekiant užtikrinti tinkamos dozės naudojimą, kūno svorį reikia nustatyti kiek įmanoma tiksliau ir būtina patikrinti dozavimo prietaiso tikslumą.

Kiaulės

Veisliniai gyvuliai: standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 1 g Alphafluben 50 mg/g, vaistinio premikso 50 kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 10 dienų iš eilės.

Nujunkyti paršeliai ir penimos kiaulės: standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 1 g Alphafluben 50 mg/g, vaistinio premikso 50 kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 5 dienas iš eilės. Sunkaus apsikrėtimo *Trichuris* atveju gydymo trukmė yra 10 dienų iš eilės.

Ruošiant vaistinį pašarą, būtina atsižvelgti į kasdienį pašaro sunaudojimą, kuris priklauso nuo gydomų gyvūnų klinikinės būklės ir kūno svorio. Todėl tikslų į pašarą dedamo vaisto kiekį reikia apskaičiuoti pagal toliau pateiktą formulę, kad būtų užtikrintas aukščiau nurodytas dozavimas:

$$\frac{20 \text{ mg veterinarinio vaisto}}{1 \text{ kg kūno svorio per vieną dieną}} \times \text{vidutinis kiaulės kūno svoris (kg)} = \text{mg veterinarinio vaisto 1 kg pašaro}$$

Vidutinis kasdienis pašaro sunaudojimas
(kg/gyvūno)

Vištos

Standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1,43 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 28,6 mg Alphafluben 50 mg/g vaistinio premikso kiekvienam kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 7 dienas iš eilės.

Ruošiant vaistinį pašarą, būtina atsižvelgti į kasdienį pašaro sunaudojimą, kuris priklauso nuo gydomų gyvūnų klinikinės būklės ir kūno svorio. Todėl tikslų į pašarą dedamo vaisto kiekį reikia apskaičiuoti pagal toliau pateiktą formulę, kad būtų užtikrintas aukščiau nurodytas dozavimas:

$$\frac{28,6 \text{ mg veterinarinio vaisto 1 kg kūno svorio per vieną dieną}}{1 \text{ kg kūno svorio per vieną dieną}} \times \text{vidutinis paukščio kūno svoris (kg)} = \text{mg veterinarinio vaisto 1 kg pašaro}$$

Vidutinis kasdienis pašaro sunaudojimas
(kg/gyvūno)

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su geriamuoju vandeniu ar skystu pašaru. Nepurkšti ant granulių ar grūdų.

Jei gyvūnai gydomi kartu, o ne kiekvienas atskirai, kiaules ir vištas reikia suskirstyti į grupes pagal jų kūno svorį ir dozuoti atitinkamai, norint išvengti per mažų ar per didelių dozių naudojimo.

Prieš gydymą ar po jo nereikalinga jokia speciali mitybos kontrolė. Negalima naudoti kitokios dozės, nei nustatyta, ir ilgesnį laikotarpį.

Veterinarinį vaistą galima įmaišyti į granuliuotą pašarą, apdorotą garais ne aukštesnėje nei 85°C temperatūroje.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Kiaulėms 5 mg flubendazolo/kg kūno svorio arba didesnė koncentracija gali sukelti lengvos formos viduriavimą (laisvas išmatas).

Vištoms flubendazolas pasižymi mažu ūmiu oraliniu toksiškumu ir yra gerai toleruojamas paskirties gyvūnų rūšių.

4.11. Išlauka

Kiaulės: skerdienai ir subproduktams: 5 paros.

Vištos: skerdienai ir subproduktams: 3 paros.

Kiaušiniams: 0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: benzimidazoliai ir susijusios medžiagos; flubendazolas.

ATC vet kodas: QP52AC12

5.1. Farmakodinaminės savybės

Flubendazolas yra sintetinis antihelmintikas, priklausantis halogenintai benzimidazolo karbamatų grupei, kuris slopina mikrovamzdelių susijungimą absorbcinėse nematodų ląstelėse. Benzimidazoliai palaipsniui ardo energijos atsargas ir slopina atliekų ir apsauginių faktorių išsiskyrimą iš parazitinių ląstelių. Ląstelių transportavimo ir energijos metabolizmo slopinimas yra mikrovamzdelių depolimerizacijos pasekmės.

Flubendazolas prisijungia prie tubulino, dimerinio mikrovamzdelių subvieneto baltymo. Jis slopina mikrovamzdelių susijungimą absorbcinėse ląstelėse, t. y. nematodų žarnyno ląstelėse. Tai parodo citoplazminių mikrovamzdelių išnykimas ir sekrecinių granulių kaupimasis citolazmoje dėl jų transportavimo bloko, dėl ko sutrinka ląstelių membranos danga ir sumažėja maistinių medžiagų virškinimas ir pasisavinimas. Negrįžtama lytinė ląstelių degeneracija dėl sekrecinių medžiagų (hidrolizinių ir proteolitinių fermentų) sukelia parazito mirtį.

Šie pokyčiai yra santykinai greiti ir pirmiausia pastebimi tuose organoiduose, kurie tiesiogiai dalyvauja sekrecinėse ir absorbcinėse ląstelių funkcijose.

Priešingai, gyvūnų šeimininkų ląstelėse pokyčiai nepastebimi.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Flubendazolas labai prastai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Tai rodo didelis su išmatomis išskiriamas nepakitęs pradinio vaisto kiekis. Labai maža dalis ekstensyviai metabolizuojama kepenyse, vykstant hidrolizei ir redukcijai. Biotransformacijos produktai konjuguojami į gliukuronidus arba sulfato konjugatus ir nedideliais kiekiais pašalinami su tulžimi ir šlapimu. Su šlapimu pašalinamas kiekis yra santykinai mažas; jį sudaro beveik vien metabolitai ir tik nedidelis nepakitęs junginio kiekis.

Kiaulėms didžiausias prastai įsisavinamų medžiagų kiekis audiniuose matuojamas kepenyse ir inkstuose. Flubendazolo pusinės eliminacijos laikas audiniuose yra 1–2 dienos. Vištoms flubendazolo pusinės eliminacijos laikas plazmoje ir audiniuose yra 1–4 dienos.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozės monohidratas,
titano dioksidas (E171),
natrio laurilsulfatas.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 42 d.

Tinkamumo laikas, įmaišius į granuliuotą pašarą, – 3 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Atidarytą maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Trijų sluoksnių popierinis maišelis su HDPE vidiniu sluoksniu.

Pakuotės dydis 12 kg vaistinio premikso.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

ALPHAVET Zrt.

H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

Telefono numeris: +36/22-516-546

Fakso numeris (pasirinktinai): +36/22-516-546

El. paštas: alpha-vet@alpha-vet.hu

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2582/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2020-02-27

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2025-04-28

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Įmaišant vaistinį premiksą į pašarą, būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus.

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

BENDROJI ETIKETĖ IR INFORMACINIS LAPELIS
Alphafluben 50 mg/g, vaistinis premikss kiaulėms ir vištoms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:
ALPHAVET Zrt., H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 42., Vengrija.

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Alphafluben 50 mg/g, vaistinis premikss kiaulėms ir vištoms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekviename grame yra:
veikliosios medžiagos:
flubendazolo 50 mg.

Rusvai balti milteliai be mechaninių priemaišų, krešulių ar sankaupų.

4. VAISTO FORMA

Vaistinis premikss.

5. PAKUOTĖS DYDIS

12 kg

6. INDIKACIJA (-OS)

Apsikrėtimų, sukeltų toliau nurodytų subrendusių ir nesubrendusių stadijų nematodų gydymas:

Kiaulės: *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus* (raudona skrandžio kirmėlė), *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis* ir *Strongyloides ransomi* (tik suaugusių forma).

Vištos: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*

7. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti balandžiams ir papūgoms.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

8. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma taikant terapines dozes.

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema www.vmv.lt

9. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės (penimos), vištos (broileriai).

10. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojimo metodas

Naudoti per burną. Naudoti tik su pašaru.

Siekiant užtikrinti tinkamos dozės naudojimą, kūno svorį reikia nustatyti kiek įmanoma tiksliau ir būtina patikrinti dozavimo prietaiso tikslumą.

Kiaulės

Veisliniai gyvuliai: standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 1 g Alphafluben 50 mg/g, vaistinio premikso 50 kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 10 dienų iš eilės.

Nujunkyti paršeliai ir penimos kiaulės: standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 1 g Alphafluben 50 mg/g, vaistinio premikso 50 kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 5 dienas iš eilės. Sunkaus apsikrėtimo *Trichuris* atveju gydymo trukmė yra 10 dienų iš eilės.

Ruošiant vaistinį pašarą, būtina atsižvelgti į kasdienį pašaro sunaudojimą, kuris priklauso nuo gydomų gyvūnų klinikinės būklės ir kūno svorio. Todėl tikslų į pašarą dedamo vaisto kiekį reikia apskaičiuoti pagal toliau pateiktą formulę, kad būtų užtikrintas aukščiau nurodytas dozavimas:

$$\frac{20 \text{ mg veterinarinio vaisto}}{1 \text{ kg kūno svorio per vieną dieną}} \times \frac{\text{vidutinis kiaulės kūno svoris (kg)}}{1} = \text{mg veterinarinio vaisto 1 kg pašaro}$$

Vidutinis kasdienis pašaro sunaudojimas
(kg/gyvūno)

Vištos

Standartinė rekomenduojama bendroji dozė yra 1,43 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio per vieną dieną, kuri atitinka 28,6 mg Alphafluben 50 mg/g, vaistinio premikso kiekvienam kg kūno svorio per vieną dieną, naudojant 7 dienas iš eilės.

Ruošiant vaistinį pašarą, būtina atsižvelgti į kasdienį pašaro sunaudojimą, kuris priklauso nuo gydomų gyvūnų klinikinės būklės ir kūno svorio. Todėl tikslų į pašarą dedamo preparato kiekį reikia apskaičiuoti pagal toliau pateiktą formulę, kad būtų užtikrintas aukščiau nurodytas dozavimas:

$$\frac{28,6 \text{ mg veterinarinio vaisto 1 kg kūno svorio per vieną dieną}}{\text{vidutinis paukščio kūno svoris (kg)}} = \text{mg veterinarinio vaisto 1 kg pašaro}$$

Vidutinis kasdienis pašaro sunaudojimas
(kg/gyvūno)

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su geriamuoju vandeniu ar skystu pašaru.

Nepurkšti ant granulių ar grūdų.

Jei gyvūnai gydomi kartu, o ne kiekvienas atskirai, kiaules ir vištas reikia suskirstyti į grupes pagal jų kūno svorį ir dozuoti atitinkamai, norint išvengti per mažų ar per didelių dozių naudojimo.

Prieš gydymą ar po jo nereikalinga jokia speciali mitybos kontrolė.

Negalima naudoti kitokios dozės, nei nustatyta, ir ilgesnį laikotarpį.

11. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Negalima naudoti Alphafluben, pastebėjus matomų vaisto gedimo požymių.

Veterinarinį vaistą galima įmaišyti į granuliuotą pašarą, apdorotą garais ne aukštesnėje nei 85 °C temperatūroje.

12. IŠLAUKA

Kiaulės: skerdienai ir subproduktams: 5 paros.

Vištos: skerdienai ir subproduktams: 3 paros.

Kiaušiniams: 0 parų.

13. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Atidarytą maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.

14. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pasireiškus infekcijai su klinikiniais simptomais, būtina gydyti visus vienas su kitu kontaktuojančius gyvūnus ir būtina imtis atitinkamų zoohigieninių priemonių.

Būtina vengti toliau išvardintų veiksmų, nes jie didina atsparumo išsivystymo riziką ir gali lemti gydymo neveiksmingumą:

- pernelyg dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės antihelminčių vaistų naudojimas ilgą laiką;
- per mažos dozės naudojimas, dėl netinkamai įvertinto kūno svorio, neteisingo vaisto naudojimo vaistą arba nekalibruoto dozavimo prietaiso (jei toks naudojamas).

Įtariamus klinikinius atsparumo antihelminčiniams vaistams atvejus reikia ištirti atitinkamais tyrimais (pvz., kiaušinėlių skaičiaus išmatose sumažėjimo tyrimu). Jei tyrimo (-ų) rezultatai rodo atsparumą tam tikriems antihelminčikams, reikia naudoti kitai farmakologinei klasei priklausančią antihelminčiką, kuris pasižymi kitokiu veikimo mechanizmu.

Dėl pernelyg dažno ir pakartotinio tos pačios klasės antihelminčių vaistų naudojimo ilgą laiką gali išsivystyti atsparumas benzimidazolams (į kuriuos įeina flubendazolas). Dėl šios priežasties šis vaistas turi būti naudojamas remiantis vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija dėl jautrumo nematodams bei rekomendacijomis, kaip sumažinti tolesnę atranką dėl atsparumo antihelminčiniams vaistams.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Netaikytinos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Žmonės turi vengti atsitiktinio prarijimo. Esant sąlyčiui su oda, gali pasireikšti jautrumas.

Gali dirginti odą ir akis. Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas flubendazolui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – kombinezonas ir nelaidžios pirštinės.

Patekus ant odos, nuplauti paveiktas vietas. Netyčia patekus į akis, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei naudojant galimas dulkių poveikis, naudoti arba vienkartinį filtrą ant vienkartinės puskaukės-respiratoriaus, atitinkantį Europos standartą EN149, arba daugkartinį respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN140, su filtru, atitinkančiu EN 143.

Jei panaudojus vaistą pasireiškia alergijos simptomai, pvz., odos bėrimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį. Veido, lūpų ir akių vokų patinimas bei sunkus kvėpavimas yra rimti simptomai, kuriems pasireiškus reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Naudojant šį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Panaudojus, nusiplauti rankas muilu ir vandeniu.

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu.

Kiaušinių dėjimas

Galima naudoti kiaušinių dėjimo metu.

Flubendazolas neturi įtakos kiaušinių perimui.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Kiaulėms 5 mg flubendazolo/kg kūno svorio arba didesnė koncentracija gali sukelti lengvos formos viduriavimą (laisvas išmatas). Vištoms flubendazolas pasižymi mažu ūmiu oraliniu toksiškumu ir yra gerai toleruojamas paskirties gyvūnų rūšių.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

15. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

16. ETIKETĖS PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2025-04-28

17. KITA INFORMACIJA

Talpyklė: trijų sluoksnių popierinis maišelis su HDPE vidiniu sluoksniu.

Pakuotės dydis: 12 kg vaistinio premikso.

Įmaišant vaistinį premiksą į pašarą, būtina atsižvelgti į oficialius nurodymus.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

18. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

19. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

20. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, - 42 d.

Tinkamumo laikas, įmaišius į granuliuotą pašarą, – 3 mėn.

21. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2582/001

22. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}