

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón con 1 vial de 20 ml
Caja de cartón con 1 vial de 50 ml
Caja de cartón con 1 vial de 100 ml
Caja de cartón con 1 vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MEGLUXIN 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Flunixinino 50 mg
(equivalente a 83 mg de flunixin meglumina)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, caballos y porcino.

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intravenosa en bovino y caballos.
Vía intramuscular en porcino.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne : 4 días (vía intravenosa)

Leche: 24 horas (vía intravenosa)

Porcino:

Carne : 24 días (vía intramuscular)

Caballos:
Carne : 5 días (vía intravenosa)
Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1586 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 50 ml, 100 ml o 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MEGLUXIN 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Flunixin	50 mg
(equivalente a 83 mg de flunixin meglumina)	

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, caballos y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa en bovino y caballos.

Vía intramuscular en porcino.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne : 4 días (vía intravenosa)

Leche: 24 horas (vía intravenosa)

Porcino:

Carne: 24 días (vía intramuscular)

Caballos:

Carne : 5 días (vía intravenosa)

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Vial de 20 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MEGLUXIN

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Flunixinio 50 mg
(equivalente a 83 mg de flunixinio meglumina)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Fecha límite de utilización: